

Chez cette malade la Sporotricose a-t-elle été fébrile dès le début? Il est bien permis d'en douter et d'autant plus que ces formes ne sont pas les plus communes.

“ Il est donc du devoir absolu du médecin de penser aux sporotricoses devant toute lésion qui autrefois n'éveillait dans son esprit que l'idée de tuberculose, de syphilis, de morve, de suppuration chronique ou subaiguë. Il est nécessaire de discuter ce diagnostic, même dans les cas de tuberculose ou de syphilis qui semblent les plus évidents. C'est seulement en y pensant toujours que l'on en découvrira quelques cas, pour le plus grand bonheur du bénéficiaire.” (Gougerot.)

— :O: —

DYSTOCIE PAR ŒDEME GÉNÉRALISÉ DU FŒTUS

A. JOBIN

Prof. agrégé à l'Université Laval

—

OBSERVATION

Tout dernièrement,—précisément le 19 Février 1918,—je délivrais, non sans peine, une pluripare d'un enfant en état d'*œdème généralisé*. C'est la première fois, dans mes 25 années de pratique, qu'il m'est donné d'observer un pareil cas de dystocie. Je crois du reste que la littérature médicale ne rapporte que peu d'observations de ce genre. J'ai cru qu'il ne serait pas sans intérêt, ni sans utilité, d'en donner la communication.