3° Il faut que l'orifice utérin soit complètement dilaté ou complètement dilatable.

Messieurs, ici je ne puis trop m'élever contre la conduite peu scrupuleuse de ces médecins sans conscience qui vous appliquent le forceps à tout propos. Sont-ils appelés auprès d'une parturiente, ho vite! il faut employer le forceps, peu leur importe la dilatation ou le degré de dilatabilité du col. Leur devise est de faire vite, de marcher rapidement, de voltiger d'une malade à une autre, d'arracher plutôt que de gagner honnêtement des honoraires qui ne leur seraient certainement pas dûs ni donnés si le mari ou l'épouse, victimes de leur rapacité et de leur empressement malhonnête, connaissaient le triste état des parties génitales délabrées après une mauvaise application du forceps.

Messieurs, je vous étonnerai, sans doute, en vous rapportant la conversation que j'eus un jour avec un médecin d'un certain âge, et ces paroles vous les entendrez malheureusement plus d'une fois dans la pratique. Je ne saurais trop vous mettre en garde contre la tentation de les écouter d'une oreille bienveillante et surtout de chercher à les imiter par vos actions.

Un jour, un médecin me disait: "à quoi sert de laisser souffrir une femme en travail d'enfantement au-delà d'une journée ou deux? Pourquoi ne pas la délivrer? - Mais, comment allezvous la délivrer, lui répondis-je? - Par le forceps, me dit-il. - Oui. le forceps est un instrument utile, mais lui dis-je, vous avouerez qu'on ne peut employer à tout instant de l'accouchement. Supposez, chez votre parturiente, un col rigide, avec une dilatation grande comme une piastre américaine, comment appliquerez-vous les cuillers? - Rien de plus facile, s'empressa-til d'ajouter. Il est vrai qu'on a juste l'espace d'introduire deuxdoigts, mais la première cuiller glissée sur ces deux doigts, pénètrera quand même dans le col si l'on y met de la bonne volonté. - Et comment s'est-elle frayé un chemin? - En déchirant le col. — Et la seconde cuiller comment va-t-elle rejoindre la première? - Mais encore plus aisément que sa congénère, puisque le col déchiré par la première offre une voie toute grande ouverte devant elle. - Bon, que va-t-il advenir de ce col en lambeaux. — La malade, se hâta-t-il d'ajouter, en sera quitte pour se faire opérer plus tard.