X1_	Granulas contro la t	And the second of the second	• 4. \
COMPOSITION	ACTION	toux nerveuse (4 fr. la	
Nulfhydral, 1 centl. Nel de Gregory, 1 milli. Camphre mono-brome,	Calment l'irritation du laryax et de la gorge, apaisent les spasmes et invitent au sommeil.	APPLICATION Dans la coqueluche, la trachéite nigué, la toux nerveuse des hystériques, etc.	les demi-heures, Jusqu'à effet. Dans la coqueluche, un granu-
z centi.	XII. — Granules die	crostific (5 for la hoita)	le après chaque quinte.
XII. — Granules digestifs (5 fr. la boîte) Arseninto do strychnine, Excitent l'appetit, facilitent la Dans les digestions difficiles, les Un à deux granules avant les prises			
14 milli. Quassino amorphe, 5 milli. Papaïno pure, 2 centi.	digestion, regularisent les garde- robes.	pesanteurs d'estomac, les fermenta- tions anormales, les gastro-entérites, dyspepsies, etc., et dans les convales- cences.	сірацх герав.
XIII. — Granules contre les maladies du cœur (4 fr. la boîte)			
Arséniato do strychnine, ½ milli. Digitaline, 1 milli. Arsén, do fer, ½ milli.	Excitent et régularisent les batte- ments du cœur, augmentent la crâse sanguine et tonifient l'organisme.	Dans les endocardites, la myocar- dite parenchymateuse, l'arythmie, l'asystolie, l'albuminurie, l'anasar- que, etc.	les 4 h., on toutes les 3 h., ou toutes
XIV. — Granules contre le catarrhe des bronches (4 fr. la boîte)			
Iodoforme, , milli. Codéine, 5 milli. Emétine, ½ milli.	Amènent un état nauséeux qui fa- vorise l'expectoration, en même temps que la toux est calmée et les	·	Deux A trois doses le matin A joun ;
XV. — Granules sudorifiques et résolutifs (5 fr. la boîte)			
Emétine, 14 milli. Chlorhydrato de pilocar- pine, 1 milli. Sel de Gregory, 1 milli.	Calment la douleur des angines, détachent les exsudats, amènent la résolution des engorgements pulmo-	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Un granule toutes les ½ h. d'abord, jusqu'à diaphorèse et état nauséeux, puis, toutes les 2 h. seulement.
XVI. — Granules antiasthmatiques (5 fr. la boîte)			
Arseniato do strychnine, ½ milli. Hyosciamine, ½ de milli. Lobeline, ½ milli.	Font cessor le spasme respiratoire et calment les accès de suffocation.	Pendant les accès d'oppression, dans l'asthme catarrhal, dans l'asth- me cardiaque, dans le catarrhe suffo- cant, l'emphysème pulmonaire, etc.	dans les cas aigus, jusqu'à jugulation
XVII. — Granules antiblennorrhagiques (4 fr. la boîte)			
Suffhydral, i centi. Camphre mono-bromé, i centi. Cubébine, i milli. Piperine, i milli.	Désinfectent les voies urinaires, détruisent les micro-organismes pa- thogènes, calment le ténesme vésical.	Dans l'uréthrite simple, la blennor- rhagie, la cystite blennorrhagique, etc.	Un granule toutes les heures dans les cas aigus, puis toutes les 2 heures.
XVIII. — Granules diurétiques et antispasmodiques (4 fr. la boîte)			
Ars. de strychnine, 3/ milli.	Calment le ténesme et les douleurs lancinantes, détruisent le spasme du col de la vessie et excitent la sécrétion urinaire.	Rétention d'urine, dysurie, cystite	
XIX. — Granules contre le rhumatisme et la goutte (4 fr. la boîte)			
Colchicine, 1 milli. Aconitine, ½ milli.	Agissent sur l'élément diathésique, calment la douleur, abaissent la tem-	Dominante dans le rhumatisme	Un granule toutes les ½ heures dans les cas aigus, jusqu'à état nau-
XX. — Granules antiherpétiques (3 fr. la boîte)			
Arsen. de strychnine, ½milli. Veratrine, ½ milli.	Calment les poussées à la peau, en même temps qu'ils tonifient l'orga-	Dominante dans l'urticaire, l'eczè- ma, l'herpès zoster, la fièvre herpè-	Un granule toutes les heures dans
XXI. — Granules antidiarrhéiques (4 fr. la boîte)			
	Modérent le flux intestinal, calment les douleurs abdominales et désin- fectent le canal digestif.		Un granule 4 & 8 fois par jour.
XXII. — Granules contre l'anémie et la chlorose (4 fr. la boîte)			
Arséniato de fer, 1 mili. Quassine, 2 milli. Bromhydrato de quinine, 1 centi.	Augmentent la crase sanguine, ré- gularisent les garde-robe, s'opposent aux poussées fébriles périodiques.	Dominante dans l'anémie, la chlo- rose, les convalescences, etc.	Quatre à huit granules par jour dans les cas aigus, s à 4 ensuits.