TRAITEMENT DE LA NÉPHRITE AIGUE A FRIGORE.

Après l'infection grippale et du nt l'épidémie de scarlatine que nous avons, la néphrite aiguë a frigore est des plus grands dangers auxquels sont exposés ceux qui ont souffert de ces maladies.

L'indication principale est de lutter contre la congestion rénale, se traduisant par une diminution du taux des urines. Avant tout, il faut pratiquer une révulsion énergique au niveau du rein, les communications intimes, existant entre les vaisseaux de la peau et les vaisseaux du rein, assurent le succès certain de cette médication.

Toutes les fois que le sujet est suffisamment sanguin et résistant, il faut appliquer, au niveau du rein, huit à douze sangsues, et avoir soin par un trait tracé au crayon dermographique, d'indiquer l'endroit où elles doivent être placées. Il ne faut pas craindre de laisser saigner le malade; à cet effet on applique sur les piqûres des cataplasmes bien chauds qui seront de bons adjuvants pour l'écoulement sanguin et la décongestion. Enfin, au bout de deux heures en moyenne, on arrête l'écoulement sanguin bien que, si le malade est résistant, il puisse être continué durant quatre à cinq heures.

Si l'entourage s'oppose formellement à l'emploi des sangsues, on peut recourir aux ventouses scarifiées qui donnent le même résultat. Enfin, si le malade est très anémié, si la famille s'oppose à toute émission sanguine, on peut employer les ventouses sèches ou les pointes de feu; mais, toutes les fois qu'on le peut, il faut avoir recours aux sangsues et aux ventouses scarifiées. Grâce à ces médications, le taux des urines est rapidement augmenté et la décongestion diminuée d'une façon notable.

On peut en même temps employer le traitement décongestif à distance, et M. Lemoine fait toujours purger ses malades, et cela pour deux raisons: il décongestionne leur intestir et les désinfecte en même temps. Comme purgatif, il faut rejeter ceux qui sont absorbés par osmose et s'éliminent par les reins, tels les purgatifs salins. On donnera par conséquent de l'huile de ricin à la dose de 20 à 30 grammes selon les individus.

Ce n'est pas encore tout. Si les urines ne sont pas assez abon-