

REVUE DES JOURNAUX

LES LUXATIONS CONGÉNITALES DE LA HANCHE A SYMPTOMES TARDIFS

Par M. Carle RØDERER

Ancien assistant d'orthopédie des hôpitaux.

Il arrive constamment que des luxations congénitales échappent aux regards des médecins de famille, et l'on serait volontiers porté à croire soit à un défaut de connaissance, soit à une erreur de jugement. C'est précisément cette opinion qui dénoterait un défaut d'expérience.

Sans doute quand la luxation se présente tard et répond au magistral et classique tableau de Dupuytren, le doute n'est plus permis et l'erreur est blâmable. Mais il arrive fréquemment à un spécialiste averti, d'hésiter longuement chez un sujet jeune à discerner la luxation. Les signes habituels — déformation, raccourcissement — peuvent manquer. L'interprétation de la boiterie est, à cet âge, fort difficile, puisque, suivant le mot de Palleta, l'enfant normal " vacille, tombe tantôt à droite, tantôt à gauche et semble boiter des deux côtés ". La palpation souvent ne donne pas de données certaines et c'est la radiographie qui fournit, et encore, d'aucune fois pour l'œil exercé seulement, un diagnostic précis.

Syphilis
Artério-sclérose, etc.
(Todoro-Enzymes)
Todore sans Todisme

Todurase

de COUTURIEUX.

57, Ave. d'Antin, Paris,
en capsules dosées à 50 ctg. d'Io.
dure et 10 ctg. de Levurine.