

odeur. A des surfaces dénudées, malades, correspondent des lochies de mauvaise nature; elles deviennent fétides la plupart du temps, elles ont une teinte café au lait, une apparence chocolatée, formant une bouillie infecte. On a affaire alors soit à l'endométrite putride, soit à l'endométrite septique.

L'affection ne débutera pas toujours avec un si grand fracas. Elle pourra s'annoncer par l'abondance, la persistance et la nature de l'écoulement lochial. Moins une femme perd dans ses couches, moins dure l'écoulement lochial, moins il y a de raison de redouter une métrite. Plus le liquide est clair, sans mélange de pus, plus on a de raisons de croire à l'intégrité de la muqueuse utérine du corps et du col; tandis qu'un écoulement muco purulent abondant, persistant, indique l'existence d'un catarrhe utérin, qu'il soit d'origine ancienne ou récente.

M. Rémy signale encore un phénomène qu'il considère comme le signe d'une congestion utérine persistant au-delà des limites régulières et marquant la prédisposition à l'engorgement utérin ultérieur, et aux altérations hémorrhagiques de la muqueuse. C'est l'exagération de l'écoulement sanguin appelé le petit retour. On sait qu'on entend sous ce nom l'apparition d'un léger écoulement de sang pur vers le seizième jour, un peu plus tôt ou un peu plus tard, durant deux à quatre jours. Cet écoulement sanguin paraît lié à des phénomènes ovariens, à une ovulation et il représente une menstruation. Or cette hémorrhagie, légère dans les conditions normales, prend parfois le caractère d'une véritable métrorrhagie soit par l'abondance du sang, la longue durée de l'écoulement, et sa tenacité. Or n'est-ce pas là l'analogue de ce que l'on observe dans la métrite hémorrhagique plus ou moins fongueuse? On a là le signe d'une congestion utérine persistante, d'une réparation défectueuse de la muqueuse, d'une fragilité spéciale des parois des vaisseaux de cette muqueuse. Celle-ci sera exposée à rester saignante et à reproduire les métrorrhagies à chaque époque cataméniale.

Il est encore un phénomène pathologique qui est bien fait pour faire redouter une métrite ultérieure: c'est l'accès de fièvre précédant chez quelques accouchées le petit retour. On voit, en effet, dans les Maternités dans lesquelles les femmes accouchées séjournent assez longtemps, la température, qui s'était maintenue pendant un certain temps à la normale, s'élever, vers les 14^e 15^e jours à 38°, 38,5 et tomber à l'apparition de l'écoulement sanguin du petit retour.

Voici maintenant en quoi consistent les manifestations ultérieures de l'affection utérine.

Une première manifestation d'un état pathologique de l'utérus consiste dans le caractère métrorrhagique qu'affecte le "grand retour" vers les 6^e, 7^e, 8^e semaines de couches. La femme perd à cette occasion du sang en abondance, souvent sous forme de caillots, avec douleurs de reins, etc., et cette métrorrhagie réclame le séjour au lit et