

# PHARMACOLOGIE.

## FORMULAIRE

*Formule de lavement alimentaire dans l'ulcère de l'estomac.*

Lait . . . . .	250 c. cubes, (8 onces)
Jaune d'œuf . . . . .	n <sup>o</sup> 2
Sel de cuisine, . . . . .	une pincée.
Vin rouge . . . . .	une c. à soupe.

Faire prendre trois lavements dans les 24 hrs., après un lavement évacuateur, chaque matin.

*Contre les coliques :*

Liquueur ammoniacale anisée . . . . .	10 grammes
Liquueur d'Hoffmann . . . . .	2 "
XX à XXX gouttes dans de l'eau sucrée :	

ou la potion suivante :

Teinture d'anis . . . . .	xx gouttes
Ether sulfurique . . . . .	xxx "
Laudanum . . . . .	x "
Sirop simple . . . . .	50 grammes
Eau de mélisse . . . . .	125 "

1 cuillerée à bouche toutes les heures.

1<sup>o</sup> *Médication apéritive :*

Poudre de colombo . . . . .	} ââ 0 gr. 50 centig.
Bic. de soude . . . . .	
Pour 1 cachet n <sup>o</sup> 20.	

Un cachet une demi-heure avant le repas.

2<sup>o</sup>

Teinture de Colombo . . . . .	} ââ 10 grammes.
" gentiane . . . . .	
" ipecac . . . . .	

Prendre de 20 à 30 gouttes dans un peu d'eau une demi-heure après le repas, deux à trois fois par jour.

3<sup>o</sup> *Contre les douleurs tardives, dues à un spasme du pylore, on peut donner :*

Bicarbonate de soude . . . . .	0 g. 75 centigr.
Magnésie calcinée ou craie préparée . . . . .	0 g. 25 "
Poudre de belladone . . . . .	0 g. 02 "
Pour un cachet n <sup>o</sup> 20.	

Un cachet de deux en deux heures ou de trois heures en trois heures.