

de la moitié des cas. Elle peut être administrée à des doses élevées, soit 30 à 45 centigrammes par jour, à condition de commencer par des doses faibles. Elle donne aussi des résultats dans les crises laryngées du tabès et devrait être essayée de nouveau contre ce symptôme.

Sur quelques effets Opthériques de l'hypophyse, par L. Rénon Arthur Delille. (Société de thérapeutique. *Rev. Neur.*)

L'injection matin et soir de 10 centigr. de poudre totale d'hypophyse de bœuf détermine une action opthérique générale se traduisant par le ralentissement du pouls, l'élevation de la tension artérielle, le réveil de l'appétit et l'amélioration du sommeil.

Dans la maladie de Basedow la médication hypophysaire amène rapidement la diminution du tremblement, de l'exophtalmie, des troubles digestifs, des sueurs, des sensations de chaleur pénible. La tachycardie cède plus lentement, le goitre diminue peu.

Dans la tuberculose pulmonaire chronique la tension artérielle s'élève, le nombre des pulsations diminue malgré la fièvre. On note un certain relèvement de l'appétit et une reprise du sommeil.

Dans deux cas de fièvre typhoïde la maladie a tourné court, le pouls s'est abaissé, la tension s'est relevée, une polyurie abondante s'est établie.

Tous ces résultats posent la question de l'atteinte hypophysaire dans les infections et de l'insuffisance hypophysaire dans la maladie de Basedow. Au nombre des symptômes de cette insuffisance il faudrait compter l'abaissement de la tension artérielle, l'accélération du pouls, l'insomnie, la diminution de l'appétit, la facilité des sudations, la sensation de chaleur pénible.

E. P. CHAGNON.

PHARMACOLOGIE

Potion contre la bronchite (sans opium):

Teinture d'aconit.	4 gouttes
Sirop de fleur d'oranger.	20 grammes
Eau distillée.	90 —

Une cuillerée à café tous les $\frac{1}{4}$ d'heure pendant une heure; ou bien toutes les $\frac{1}{2}$ heures pendant 4 à 6 heures; ou bien toutes les 2 heures pendant 24 heures. (Pour un enfant d'un an.)

Contre le coïza aigu:

Salicylate de soude.	30 grammes
Poudre de Dover.	4 —
Essence de menthe poivrée.	1 goutte
en 20 paquets.	

Un paquet avec un peu d'eau toutes les 3 ou 4 heures. Diminuer à mesure que l'amélioration se manifeste.

Contre la bronchite capillaire (sans opiacé):

Penzoate de soude.	1 gramme par année d'âge
Sirop d'ipéca.	5 — " " "
Sirop d'eucalyptus.	10 — " " "
Eau distillée de menthol.	q. s. pour 60 c. cubes

Une cuillerée à café ou à dessert toutes les 2 heures dans un peu de thé faible édulcoré au miel.