

où ils différaient des individus que nous rencontrâmes aux Carolines basses ainsi qu'à Gualan, par une taille un peu plus petite, une couleur noire plus terne, (ce qui est presque commun aux deux sexes) et par une manière d'être plus tranquille. Ces deux oiseaux pourraient peut-être bien former deux espèces distinctes, mais alors les mâles de chacune seraient facilement confondus, surtout dans les musées. Au reste, il arrive souvent que la même espèce, appelée à vivre sur des îles séparées, vient à dévier du type générique, tant dans les mœurs que dans l'aspect extérieur.

On ne pouvait s'attendre, vu le peu d'étendue de ces îles, à y trouver beaucoup d'animaux; cependant on y remarquait parmi les êtres animés une plus grande diversité que dans les îles situées plus à l'Ouest; ce qui doit paraître particulier, puisque celles-ci se rapprochent davantage du continent. Nous prîmes, comme à Ualan, deux mammifères dont l'un est un *Pteropus* (*Pteropus pelagicus* m.), qui sans aucun doute diffère de celui de cette île, tant par sa taille qui est beaucoup moindre, que par une tache blanche de forme circulaire qu'il a sur l'abdomen. Comme le premier, celui-ci vole en plein jour; mais ce qui nous surprit, c'est sa force musculaire et sa ténacité à la vie,