

Cacodylate ferrique. — 2 à 3 cc. par 24 h. de la sol. à 3%.—
Assez douloureux, et bien assimilé.

Citrate de fer vert. — 10 centigr. par 24 h., en 1 ou 2 inj. Quelquefois indurations. — Douloureux.

Citrate de fer ammonical. — 10 centigr. par 24 h. en 1 ou plus, inj.
— Moins douloureux et plus absorbable que le citrate vert.

Formiate de fer. — 3 à 5 centigr. par 24 h. — Peu douloureux, assez bien assimilé.

Méthylarsinate. — Comme le cacodylate.

Pyrophosphate de fer citro-ammoniacal. — Pos. 10 à 20 centigr. par 24 h.— Douloureux, s'absorbe assez bien.

Fibrolysine (nom déposé). — Solution de thiosinamine dans le salicylate de soude. — (V. Thiosinamine).

Formiates de chaux ou de soude. — P. T. : Toniques du système musculaire, diurétiques. — Ind. : Neurasthénie, convalescences, hyposthénie avec dilatation du cœur. — Pos. : 5 à 20 centigr. par jour. — Inj. sous-cut.

Formiate de fer. — (V. Fer).

Formiate de quinine. — (V. Quinine).

Formique (Acide). — Ind. : Toutes les formes de rhumatismes. — Pos. : 10 à 30 inj. de 1 cc. de la solut. à 2 %, autour de l'articulation douloureuse (insensibiliser au préalable avec la cocaïne ; réaction vive).

(A suivre)

— 0:0:0 —

FORMULAIRE'S

MODE D'ADMINISTRATION DE LA SANTONINE

Le meilleur et le plus usité des vermifuges est certainement la santonine.

Mais son action dépend souvent de son mode d'administra-