

re le creek
Goldbottom,
re en 1896
fit sa décou-
vrit la rive
posé d'hom-
ays, se diri-
ement élevée
at son maxi-

angé la con-
du Yukon.
ères Yukon
çant bientôt
e: istration
ent établie.
a de fer de
ar le canal
ewes, d'un
ande flotte
er à Daw-
es amélio-
ommunica-
ion par le
Ces routes
s des pre-
transport-
s graviers
ut être ex-

la rivière
al par la
r le creek
la rivière
e embras-
urs d'eau
taine me-

surs, mais un petit nombre seulement sont rémunérateurs. Les cours d'eau, les meilleurs producteurs, sont le creek Bonanza, avec ses fameux affluents les creeks Eldorado, Bear et Hunker se jetant dans le Klondike et les creeks Quartz et Dominion avec les creeks Gold-run et Sulphur, deux affluents de ce dernier se jetant dans la rivière Indian. En plus, des claims ont été exploités avec profit sur le creek Allgold, affluent du creek Flat, et sur l'Eureka, un affluent de la rivière Indian venant de l'est.

TOPOGRAPHIE

TRAITS SUPERFICIELS GÉNÉRAUX.

La région du Klondike est un exemple type d'une région élevée profondément dissequée. Elle forme une plate-forme du Yukon et de la péninsule ancienne qui, à une période de sa histoire, s'est élevée en haut plateau et a été ensuite entaillée par une multitude de petits cours d'eau affluents des cours d'eau principaux. Aux époques relativement récentes, un deuxième mouvement d'élévation a eu lieu et a amené un autre approfondissement des vallées, de 500 à 700 pieds. Des pentes des anciens fonds de vallées encore couvertes de fortes accumulations de gravier se trouvent en beaucoup d'endroits formant des terrasses de largeurs diverses bordant des vallées plus nouvelles.

À distance, le district du Yukon présente un aspect accidenté, même montagneux, mais il consiste en réalité en une série de longues arêtes se ramifiant et dont les sommets ont été courbés irrégulièrement en collines et creux par une dénudation inégale, la plupart des collines naissent à ou près du Dôme qui est le centre topographique du district et son point le plus élevé.

Le Dôme est situé à dix-neuf milles au sud-est de Dawson, à mi-chemin à peu près entre la rivière Indian et le Klondyke. La hauteur est de 4,250 pieds à peu près au-dessus du niveau de la mer, 3,050 pieds au-dessus du Yukon à Dawson et 500 pieds à peu près au-dessus des arêtes de base. Il n'est pas visiblement plus élevé que les collines du voisinage et la diminution graduelle de hauteur vers l'extérieur le long des arêtes qui en rayonnement est à peine visible à l'œil. Le Dôme est le centre d'égouttement principal du district. C'est de là que les creeks Allgold et Dominion partent vers l'est; les creeks Quartz et Sulphur vers le sud et les creeks Goldbottom de Hunker vers le nord. Les arêtes séparant ces cours d'eau bien qu'entaillées souvent et profondément par les vallées tributaires sont ininterrompues et l'on peut en partant du Dôme atteindre n'importe quelle partie du district sans