

# TRAVAUX ORIGINAUX

---

## NOTES SUR L'INTERVENTION ELECTRIQUE DANS LA PARALYSIE INFANTILE

---

Ce procédé comme méthode de choix, bien élaborée et raisonnée, à la fois dans le diagnostic et le traitement de la poliomyélite, ne date réellement que de quelques années passées.

C'est *deux semaines* environ après le début de la maladie que l'on peut et doit recourir à l'*examen électrique*.

1<sup>o</sup> La *simple diminution* de la contractilité faradique des muscles atteints, si celle-ci persiste encore, et sa persistance au bout d'une quinzaine après le début de la maladie, indiquent un pronostic favorable et une guérison prochaine dans l'espace de deux à trois mois à peu près, hâtée naturellement par des séances de galvanisation appropriée, et régulières.

2<sup>o</sup> Mais, cas plus fréquent, une réaction de dégénérescence, le plus souvent partielle, quoique rarement complète, portant généralement sur un certain nombre de muscles paralysés, indique un pronostic des plus sérieux qui requiert une électrothérapie convenable, énergiquement appliquée. Grâce à la combinaison de cette dernière avec une série d'examens électriques, on pourra tout de même évaluer sûrement l'évolution, soit régressive ou progressive suivant le cas qui s'offre, de la maladie dans le membre atteint.

---

Syphilis  
Artério-sclérose, etc.  
(Ioduro-Enzymes)  
Todure sans Todisme

**Todurase**

de COUTURIEUX.

57, Ave. d'Antin, Paris,  
en capsules dosées à 50 ctg. d'**iodure**  
et 10 ctg. de **Levurine**.

---