

Hydatide oville, *Hydatis opilla*.

Goeze, Eingew. tab. 17. fig. 10, 11. *Pallas*, Misc. Zool. tab. 12. fig. 1, 11.

Se trouve dans le foie et le péritoine des moutons.

Hydatide cérébrale, *Hydatis cerebialis*.

Vivant en communauté dans une cavité; des tubercules assez grands, couvrant le corps, et rentrant en dedans. Point de vésicules visibles.

Batsch, Bandw. fig. 34, 36. *Goeze*, Eingew. tab. 20. A. fig. 15. B. fig. 6, 8. Encycl. pl. 39. fig. 1 à 8.

Se trouve sur la cervelle des moutons, chez qui elle cause la maladie du vertige. On en a trouvé jusqu'à 500 dans la même cavité. Il est possible que ce soit cette espèce que l'on a aussi trouvée sur la cervelle de l'homme.

Hydatide vervecine, *Hydatis vervecina*.

La vésicule très-grande; le corps court, rugueusement imbriqué.

Goeze, Eingew. tab. 17. A. fig. 3, 5. Encyclopédie, pl. 39. fig. 3, 4, 5.

Voyez pl. 9. fig. 8 et 9, où elle est représentée presque de grandeur naturelle, et la tête très-grossie.

Se trouve sur le péritoine des moutons.

Hydatide granuleuse, *Hydatis granulata*.

Vivant en communauté; plusieurs tubercules très-petits sur le corps; la vésicule calleuse extérieurement et intérieurement.

Batsch, Bandw. fig. 37. *Goeze*, tab. 20. B. fig. 9, 14.

Se trouve sur le foie des moutons.

Hydatide du bœuf, *Hydatis bovina*.

La vésicule très-grande; le corps court, rugueusement imbriqué.

Se trouve dans les viscères de la poitrine du bœuf.