

Une cuillerée a s. toutes les 3 heures dans un verre d'eau alcaline.

2° *T. local* : Immobiliser les jointures malades ou sur le point de le devenir, par des enveloppements ouatés légèrement compressifs. Eviter les liniments calmants. Vous pouvez appliquer avec avantage au moment de l'enveloppement, une pommade à base de *Salicylate de Méthyle*, ou mieux, 60 à 80 gouttes du salicylate de méthyle sur une petite flanelle.

Mettez des demi-cerceaux pour empêcher le poids des couvertures sur les membres malades.

3° *T. diététique* : Il faut favoriser les sueurs et entretenir la diurèse en ouvrant largement tous les émonctoires. Le lait et les *potages légers*, joints à l'eau de Vichy, forment la base de l'alimentation. Une fois la fièvre tombée on ajoutera les légumes, les œufs. La viande ne sera reprise qu'en dernier lieu, car il faut se souvenir qu'une reprise de la maladie est souvent due à une alimentation carnée trop hâtive.

## II. CHEZ L'ENFANT.

Les indications sont les mêmes que chez l'adulte et l'intégrité du rein doit être assurée par le lait et les limonades alcalines. On donnera à un enfant au-dessous de six ans 2 à 3 grammes de salicylate de soude, soit : deux cuillerées à café toutes les quatre heures de la potion I (voir ci dessus). De six à dix ans : trois cuillerées à café ; au-dessus de dix ans la même dose que pour un adulte.

## III. CHEZ LE VIEILLARD.

S'assurer que le rein n'est pas scléreux, et par conséquent fermé à l'élimination des médicaments ; surveiller la tolérance du médicament dont l'action longue peut se manifester par des nausées, vomissements, vertiges, bourdonnements d'oreille, syncopes, diplopie, délire, collapsus.

Le salicylate a maintes fois provoqué l'avortement. Il faut se rappeler ces détails lorsqu'on traite un rhumatisant cardiaque, alcoolique ou artério-scléreux. Dans les cas d'intolérance ou de contre-indications on donnera l'*antipyrine* en cachet ou de la façon suivante :

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Antipyrine.....           | 4 grammes. |
| Bicarbonate de soude..... | 2 "        |
| Sirop de sucre.....       | 15 "       |
| Eau.....                  | 45 "       |

Une cuillerée à soupe (1 gramme) trois à quatre fois par jour suivie d'une cuillerée de la potion suivante :

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Acide citrique.....  | 2 grammes, |
| Sirop de limous..... | 15 "       |
| Eau.....             | 45 "       |

Le régime lacté est indiqué, et, si les sueurs provoquées par l'antipyrine sont trop abondantes on donnera le soir un cachet de sulfonal de 1 gramme (15 grains.) N'employer ni le *salophène* (acide phénique et salicylique), ni le salol (phénol salicylé).

## Complications du rhumatisme.

1° *Cérébrales* : La loquacité, l'hyperthermie, la rapidité du pouls, les sueurs profuses, les maux de tête, les divagations : tous ces symptômes persistants malgré le traitement chez un rhumatisant dont les jointures sont dégonflées nous permettent de faire le diagnostic de rhumatisme cérébral. Il