

Ferme expérimentale d'Indian Head, Sask.

BLÉ DURUM OU À MACARONI.

Bien que les blés durum donnent ordinairement de plus fortes récoltes dans le Nord-Ouest du Canada que dans l'Est, ils sont très peu en faveur auprès de la plupart des membres. Ceux qui cultivent quelque-une de ces variétés, doivent éviter avec le plus grand soin qu'elles ne se mêlent avec les variétés d'une valeur reconnue pour la fabrication de la farine, et ne devraient en produire qu'autant qu'il leur en faut pour les animaux ou pour des besoins particuliers.

Il a été cultivé à la ferme d'Indian Head en 1907 quatre variétés de blé durum. Elles ont été semées le 7 mai à raison d'environ un boisseau trois quarts de semence à l'acre.

N ^o varié.	Variétés essayées.	Produit moyen.	Période moy-enne.	Produit en 1907.	N ^o varié.	Variétés essayées.	Produit moyen.	Période moy-enne.	Produit en 1907.
	(Cinq ans.)	bois. lb.	jours.	bois. lb.		(Moins de 5 ans.)	bois. lb.	jours.	bois. lb.
1	Goswami	43 27	135	31 40		Gharovka jaune (4 ans.)	43 55	135	29 20
2	Roumanie	42 50	136	31		Mahmoudi (4 ans.)	42 22	135	25 49

Le rendement moyen des quatre variétés de blé durum essayées à la ferme expérimentale d'Indian Head en 1907 a été 29 boisseaux 25 lb. par acre.

AMIDONNIER ET ÉPEAUTRE.

Il a été essayé ici deux variétés d'amidonnier et deux d'épeautre. Elles ont été semées le 13 mai à raison d'environ 120 lb. de semence à l'acre.

N ^o varié.	Variétés essayées.	Produit moyen.	Période moy-enne.	Produit en 1907.	N ^o varié.	Variétés essayées.	Produit moyen.	Période moy-enne.	Produit en 1907.
	(Quatre ans.)	lb.	jours.	lb.		(Quatre ans.)	lb.	jours.	lb.
1	Amidonnier commun	2,829	129	2,020	3	Epeautre blanc	2,295	131	1,560
2	Epeautre blanc	2,735	130	2,200	4	Amidonnier roux	2,215	131	1,320

Le rendement moyen des quatre variétés d'amidonnier et d'épeautre essayées à la ferme expérimentale d'Indian-Head en 1907 a été 1,775 lb. par acre.