

vers intestinaux, ou des larves d'Oestres, ce qui complique les symptômes, ou mieux, rend incertain sur la véritable cause du mal.

L'emploi de l'huile empyreumatique, à plus ou moins forte dose, est encore le remède le plus certain et le plus facile, pour débarrasser les animaux domestiques des *tænia*.

*Tænia à tête armée de crochets.*

*Tænia cucurbitain, Tænia solium.*

Articulations quadrangulaires, légèrement engainées; leur bord latéral aigu et comprimé; les ovaires en faisceaux rameux; un orifice marginal.

*Tænia* à anneaux longs, *Tænia cucurbitain*, ver Solitaire sans épines, des Français — *Pallas*, Beytr. 1. tab. 2. fig. 1, 9. *Gleichen*, Naturf. 4. tab. 6. fig. 10, 13. *Goëze*, EIng. tab. 21. fig. 1, 12. *Encycl.* pl. 40. fig. 15, 16.

Voyez pl. 10 fig. 1 et 2, où une petite portion de la partie antérieure est représentée au tiers de la grandeur naturelle, et où la tête, vue de face, est très-grossie.

Se trouve dans les intestins de l'homme.

*Tænia vulgaire, Tænia vulgaris.*

Membraneux, grisâtre, très-long; articulations carrées, noduleuses à leur milieu, et percées de deux orifices.