

grammes (120 à 150 grains) dans les vingt-quatre heures. Il se sert de la solution suivante :

Salicylate de soude.....	.....	15 grammes (225 grains)
Eau.....	.....	225 " (8 onces)

et en donne de 4 à 8 cuillerées à bouche dans les vingt-quatre heures, chaque cuillerée étant versée dans de l'eau sucrée additionnée d'une faible quantité d'eau-de-vie ou de rhum.

M. Dujardin Beaumetz est d'avis que même quand le rhumatisme est disparu il est bon de continuer l'administration du médicament pendant une dizaine de jours et quelquefois pendant trois semaines à la dose faible de 2 à 4 grammes (30 à 60 grains) par jour.

"Lorsqu'on cesse, en effet, trop brusquement la médication, on voit des rechutes se produire. C'est là une règle presque absolue, et ces rechutes résistent plus à la médication salicylée que la première attaque."

M. Beaumetz croit que le salicylate de soude ne juggle pas le rhumatisme. Nous partageons entièrement cette manière de voir. Nous ne croyons pas cependant que la médication salicylée empêche la plupart du temps les complications rhumatismales : la péricardite et surtout l'endocardite. L'auteur répond affirmativement à la question de savoir si cette médication guérit tous les cas de rhumatisme articulaire aigu. Pour lui cela arrive dans l'immense majorité des cas. Comme lui, nous avons observé des cas de rhumatisme aigu franc où la médication salicylée a franchement manqué son effet.

Stackler, à l'hôpital Necker, a suggéré l'emploi de l'*asaprol* dans le rhumatisme poly articulaire aigu. L'*asaprol* abaisse la température et calme les douleurs. La dose est de 15 à 60 grains par jour (1 à 4 grammes).

D'après M. Dujardin-Beaumetz l'*asaprol* s'est montré égal, sinon supérieur au salicylate par la rapidité avec laquelle on a obtenu l'amélioration, puis la guérison des rhumatisants. Il ajoute que l'*asaprol* n'a déterminé aucun accident, même chez les malades albuminuriques; que jamais il n'a provoqué chez eux de bourdonnements d'oreilles, (comme le fait très souvent le salicylate de soude à hautes doses) ni de phénomènes d'intolérance.

D'après la *statistique* de M. Dujardin-Beaumetz, sur 36 cas de rhumatisme articulaire aigu, traités par l'*asaprol*, et divisés en 15 cas de rhumatisme aigu et 21 cas de rhumatisme subaigu voici la proportion des guérisons :

Sur les 15 premiers cas de rhumatisme aigu : Amélioration considérable de 12 heures à 7 jours, et guérison après 1 jour à 1 jour et demi jusqu'à 10 jours du traitement.

Quant au 21 cas de rhumatisme subaigu, il y a eu amélioration