

LA GAZETTE MEDICALE DE MONTREAL

Revue Mensuelle de Medecine, de Chirurgie et des
Sciences accessoires.

VOL. I.

MONTREAL, JUILLET 1887.

No 6.

TRAVAUX ORIGINAUX.

OTOLOGIE.

De l'eczéma du pavillon de l'oreille.

L'eczéma du pavillon de l'oreille est une maladie qui se rencontre fréquemment, surtout chez l'enfant. Il se rencontre aussi chez les jeunes filles mal réglées, aux périodes de la puberté et de la ménopause, à l'époque du sevrage, à la suite d'otorrhée, chez les scrofuleux, les arthritiques, les rachitiques, les sujets faibles et débiles. On l'observe aussi, mais rarement, chez les individus robustes et vigoureux. Les boucles d'oreilles sont aussi une cause d'eczéma.

Il peut être primitif, mais le plus souvent il résulte de la propagation d'un eczéma de la face ou du cuir chevelu. Une partie ou la totalité du pavillon peuvent être affectées. La maladie peut aussi se propager au conduit auditif externe et au tympan, ce qui occasionne des bourdonnements et de la surdité. Une seule oreille peut être affectée à la fois, mais nous voyons aussi les deux être atteintes en même temps. Certains sujets sont affectés périodiquement.

Les symptômes se présentent de la même manière que sur les autres parties du corps. La peau est rouge, gonflée. Elle est couverte de petites vésicules serrées les unes contre les autres, qui se rompent et laissent échapper un liquide ténu, roussâtre. En se concrétant, ce liquide forme des croûtes jaunâtres plus ou moins épaisses. Quelque-