

rant combien de temps le professeur Lorenz conseille-t-il d'immobiliser la jambe?

Dr C.

M. le professeur Lorenz après la réduction de la luxation, conserve durant six mois la jambe fixée dans un appareil plâtré.

Pommade contre le prurit anal :

Solutien de formol à 40 p. c. 5 gouttes
Extrait glycériné de corps thyroïde. 60 grains
Cold cream. 1 once
Mêlez. Usage externe.

Les meilleurs moyens thérapeutiques sont ceux qui sont copiés sur la nature; les réactions et les défenses de l'organisme sont en raison directe de l'intégrité et de l'activité de la cellule.

Un forgeron a les bras trop gros; un tailleur a l'échine courbée; un danseur a les jambes développées; un pianiste a les mains sillonnées de tendons et de veines, les doigts allongés et aplatis; un médecin, un avocat porte dans son visage tiré, l'empreinte universelle de sa vie cérébrale et sédentaire.

La neurasthénie, bien étudiée à l'heure actuelle et classée dans le cadre nosologique avec ses caractères et sa physionomie propres, évolue cependant dans des limites assez imprécises. Où commence et où finit au juste la vraie neurasthénie ?

Tous les êtres vivants naissent d'un germe ou d'un parent antérieur doué de vie et ils possèdent une individualité propre ayant des caractères essentiels plus ou moins semblables au *générateur*.

Dans notre profession on juge malheureusement trop la valeur intrinsèque d'un confrère, d'après sa situation financière et sociale.