

poils à travers les écailles, et un léger pinceau à l'extrémité. Incisives blanches à la base, noires au bout.—Montréal.

**La Musaraigne de Cooper**, *Sorex Cooperi*, Bachman.—Longueur  $1\frac{3}{4}$  pouce; queue  $1\frac{1}{3}$ , terminée par un flocon de poils. D'un brun noisette plus ou moins foncé, blanchâtre en dessous. Incisive antérieure avec un lobe interne en contact avec celle qui la suit. La plus petite de nos musaraignes.—St. Césaire, Montréal.

(La description de ces trois espèces devrait prendre place à la page 146 du Vol. I.)

**Le Campagnol de Drummond**, *Arvicola Drummondii*, Aud. et Bachman. *Hypudaeus Novaboracensis*, Wagner.—Longueur  $4\frac{1}{2}$  pouces; queue  $1\frac{1}{2}$  avec quelques poils, sans toutefois cacher les écailles. Jambes très courtes. Pouce avec un ongle. Oreilles un peu saillantes. D'un brun roussâtre en dessus, d'un gris jaunâtre en dessous. Une tache rousse au dessous de l'oreille —Montréal.

(Cette description devrait prendre place à la suite de la page 248, Vol. I.)

**L'Éréthizon épixanthe**. *Erethizon epixanthus*, Brandt.—Cette espèce se distingue de l'Éréthizon velu (*E. dorsatus*, Cuv.), par une couleur en général plus foncée et particulièrement par les os du museau qui sont de moitié plus longs que le crâne, tandis que dans le premier, ils sont à peine d'un tiers plus longs que le crâne.

On a apporté dernièrement, un magnifique échantillon de cette espèce à Mr. Bélanger, le taxidermiste de l'Université-Laval, pris au canton Langevin; cet individu présentait six doigts, parfaitement conformés, à chaque pieds. Le pouce semblait s'être fendu en deux pour former deux doigts distincts. Nous pensons que c'était là un écart de la nature pour cette seule espèce; cependant nous serions fort aise de recevoir de nouveaux individus des Porcs-épics du canton Langevin, afin de nous assurer si ce ne serait pas là un caractère constant.

(Cette description devrait prendre place à la page 273, Vol. I.)