

Larve cendrée avec courts poils épars noirs et des taches noires à la base des pattes écailleuses. Tête noire.



Fig. 1.

Vit sur le mélèze, *Larix Americana*, qu'elle dépouille complètement de ses feuilles ; se transforme en septembre sous l'herbe ou la mousse et éclôt au commencement de juin. Voir *Le Naturaliste Canadien*, Vol. XV, page 45.

Après le gen. *Nematus*, ajoutez le suivant :

Gen. MESSE, *Messa*, Leach.

Antennes grêles et assez longues. Ailes comme dans les, *Némates*, mais la 2e cellule cubitale avec les 2 récurrentes, recevant la 2e à sa nervure de division d'avec le 3e cubitale ; cellule lancéolée pétiolée. Corps court et robuste.

Une seule espèce rencontrée.

Messe hyaline. *Messa hyalina*, Nort. Proc. Ent. Soc. Phil. IV, 8.

♀ — Long. .16 pce. D'un noir brillant. Le labre, les mandibules, les écailles alaires, blanc. Antennes filiformes, grêles, assez longues. Ailes hyalines, le stigma blanchâtre, la 3e cubitale en carré ; ailes inférieures avec 2 cellules médianes. Pattes blanches avec les hanches noires, excepté à l'extrémité, les cuisses postérieures avec teinte roussâtre, l'extrémité de leurs jambes noirâtre. — Ottawa (Harrington).

Fig. 1. — Le *Nematus Erichsonii* à l'état parfait, grossi.