

de donner à large dose en sirop et en poudre combinés, puis 10 à 30 gouttes d'une mixture égale d'aconit et de belladone; le café noir sera en même temps administré pour combattre l'action toxique du médicament.

Si les quintes de toux provoquent le vomissement trop souvent, de manière à gêner l'alimentation de l'enfant, on devra le faire manger aussitôt après le vomissement.

Troisième période.— On associera la belladone aux toniques. quina, huile de foie de morue, vin de Chevrier.

Je tiens suspendue au-dessus du lit de l'enfant une éponge chargée d'une solution d'acide carbolique.

Disons enfin que c'est dans cette dernière période que le changement d'air rend les plus grands services. Je répète qu'il faut auprès de la mère porter le pronostic dès le début et lui dire que la guérison ne saurait être espérée avant l'époque fixée pour cette maladie qui offre presque autant de résistance que la chorée: cette déclaration a pour résultat de permettre un traitement continu, rationnel, et prévient ces inquiétudes alarmantes qui exposent à un changement nuisible du médecin et de la médication.

J'ajouterai en terminant cette troisième conférence de Jules Simon, que les hygiénistes, se basant sur certaines déclarations d'Hahnemann, Hufeland, répétées par plusieurs autres, recommandent la belladone comme prophylactique de la scarlatine. C'est la constatation des éruptions scarlatiniformes déterminées quelquefois par la belladone qui a inspiré au grand Hahnemann cette singulière idée: il est pourtant naturel de supposer qu'il y a peu de relation entre l'affection locale médicamenteuse de la belladone et l'entité morbide qui constitue la scarlatine: la distinction doit être faite et Bouchut, dans son *Traité des maladies des nouveau-nés*, me paraît avoir tort d'insister sur son emploi dans ce cas, et je confesse avoir commis le même péché en répétant ce conseil du grand maître, comme je l'ai fait déjà devant de crédules élèves que je prie bien de vouloir me pardonner.

HOPITAUX, COURS ET DISPENSAIRES.

(Notes recueillies par M. D. L.)

Il y a des iritis syphilitiques sans douleurs. (Prof. FOUCHER.)

L'iritis doit toujours donner l'éveil sur l'existence d'une syphilis datant de six à douze mois. (Prof. FOUCHER.)
