

L'eczéma chronique occupe : 1. le plus souvent le conduit auditif ; 2. rarement le pavillon de l'oreille.

Eczéma chronique du conduit.—Les symptômes de son traitement varient suivant son intensité.

a) L'eczéma est léger.—Subjectivement, démangeaisons : objectivement, simple desquamation furfuracée.

Le traitement en est facile. Trois recommandations à faire au malade :

1. Éviter soigneusement, quand il se lave, de faire pénétrer de l'eau dans ses oreilles ;

2. Ne pas se gratter avec tous les objets à sa portée (épingles à cheveux, allumette, tête de crayon, etc.) ;

3. Badigeonner trois fois par jour le conduit avec un pinceau légèrement imbibé d'un des mélanges suivants : huile d'olive mentholée, 1,740 ; huile d'olive goudronnée, 1,710 ; huile d'olive cadique, 1,710 ; huile d'olive salicylée, 1,200.

b) L'eczéma est plus accentué.—Subjectivement, surdité ; objectivement, accumulation dans le conduit de squames épidermiques formant bouchon et très adhérentes aux parois.

Il faut, avant toute chose, enlever ce bouchon. En le chassant avec une injection ? mais le bouchon, très adhérent, ne se laisserait pas détacher. En l'extrayant avec une pince ? mais on n'en aurait ainsi que des fragments : d'ailleurs, cette manœuvre, très douloureuse, produirait des excoriations pouvant être le point de départ d'une lymphangite.

Il faut d'abord ramollir le bouchon épidermique. Pour cela, pendant quarante-huit heures, remplir trois fois par jour le conduit avec une petite quantité du mélange suivant :

Carbonnate de soude..... 1^{er} centigrammes.
Glycérine neutre..... 10 grammes.

et fermer le méat avec un tampon d'ouate non hydrophile.

Au bout de ce temps : débayer le conduit avec des injections d'eau tiède, comme s'il s'agissait d'un bouchon de cérumen ; puis, sécher très soigneusement le conduit avec des mèches d'ouate hydrophile ; et appliquer le traitement indiqué plus haut contre l'eczéma subaigu du conduit (corps gras au nitrate d'argent).

Eczéma chronique du pavillon.—Sa résistance au traitement est très variable.

a) La forme légère cède généralement aux pommades indiquées plus haut à propos du traitement de l'eczéma subaigu du pavillon ;

b) La forme intense, eczéma lichénifié (pavillon de carton) réclame un traitement tout spécial.

Il faut, avant tout, décaper le pavillon, c'est-à-dire : 1. ramollir, 2. détacher les couches cornées qui lui forment une carapace.

Cela s'obtient à l'aide d'une solution alcoolique de savon mou de potasse.