

Ypsolophus.

Bucculatrix albocapitella—*Chambers.*

Tischeria Zelleria—*Clemens.*

Argyresthia Godartella.

Gelechia bicristatella—*nov. sp. (Chambers)*

“ *albomaculella*— “ “

“ *niveopulvella*— “ “

“ *Belangeriella*— “ “

Tinea marmorella— “ “

“ *marginimaculella*— “ “

“ *minutipulvella*— “ “

Anarsia albopulvella— “ “

Argyresthia Belangeriella—*nov. sp. (Chambers),*

Bucculatrix Canadensiella— “ “

Gracilaria pulchella— “ “

Leucophryne tricristatella—*nov. spec. et genus.*

LES ICHNEUMONIDES DE QUEBEC

(Continué de la page 26).

2.—*Ecusson blanc ou jaunâtre ; abdomen noir.*

11. *Ichneumon tenebrosus*, Cress. (*Ichneumon ténébreux*).

Ichneumon tenebrosus, Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. 111, p. 145, ♂.

Huit spécimens ♂.

12. *Ichneumon, mellicoxus*. (*Ichneumon à hanches rousses*). *nov. sp.*

♂. Long. .45 pouce. Grêle, effilé, corps d'un noir foncé, pattes d'un beau roux clair, brillant. Toute la face au dessous des antennes, le chaperon, les palpes, le premier article des antennes en dessous, blanc. Antennes grêles, noires en dessus, rousses en dessous. Ecailles alaires avec une tache sur l'écusson irrégulièrement définie, roussâtres. Abdomen étroit, poli et brillant à l'extrémité, d'un noir quelque peu roussâtre. Pattes, y compris les hanches et les trochantins, d'une belle couleur rousse brillante, l'extrême sommet des cuisses