

из у Індій, Нерів в Африці, Мексиканців і
інших, звичай обрізувати залиця у повона-
роуєчних діти, а те «обрізане відювало ся
і відюває ся ще й нині як складова часть пе-
туать відювільної віри. Це «обрізанню» став
головка ціле життя непокритою залицюю і через
те став неможливим, аби на головній заперкав
ся довший час тринуровий гній в такій скільки
єст, підоби від того могла занежити ся шкіра
головки.

Личне запалена головки члена має го-
ловню на меті очиснене захопліти часті. Коли
залиця доводі ширека і дасть ся легко від-
тягнути, то вистарчить уже саме змиване чи-
стою первареною водою і єххе утеркуванне
хорої часті. Колиж залиця звужена, то треба
успівати звуженне через позрізанне залиця (не
«обрізанне»). (Червильно, що се може зроби́ти
лише лікар.

5. Бородавковаті нарости на полових частях тіла (*condylomata accuminata*)

Бородавковаті нарости вистають ча-
сом у жіщини на головній члені, особливо по
боох боках привязки залиця і в довший поза
головкою, а у жіщини у вході до похви на-
віть перед звичайних відносин, ливнені залиця
нечистото утеркування полових органів. Най-
частіше причиною великого позросту боро-
давоч на полових органах є обзагнанне по-
дражнюванне гноєм із їорнотдєратої тринпо-
вої нехити. З тих бородавковатих наростів ну-
єна ся легко рпор, особливо підчас полових