

D'ailleurs, l'effet bienfaisant et immédiat des vapeurs de chloroforme établit de suite la rectitude du diagnostic, que le croup n'existe pas, ou plutôt que ce n'était qu'une angine striduleuse ou faux croup, étant donné la soudaineté de l'attaque.

Si les symptômes du croup s'établissent, les vomitifs et la trachéotomie sont les moyens recommandés et employés.

J'ai remarqué que chez les sujets qui vomissaient souvent, les fausses membranes avaient plus de difficulté à se développer et à se maintenir; j'ai fait cette observation seulement chez les enfants. Serait-ce une indication en faveur des vomitifs?—Je ne les ai jamais essayés, malgré qu'ils soient recommandés par quelques auteurs.

Monsieur le Dr Paquet constate en fait de statistiques, une mortalité de 20 à 30 par 100, suivant le caractère de l'épidémie et l'âge des malades. Chez les adultes que j'ai traités depuis 25 ans, j'ai eu à peine un ou deux par cent de mortalité, tandis que chez les jeunes enfants, la maladie a été destructive, à peine trois ou quatre par cent ont pu se sauver, car tout traitement chez ces jeunes sujets est le plus souvent impossible. De sorte que les deux statistiques des adultes et des enfants réunis établissent une mortalité considérable.

Malgré tout, je crois que chez les adultes, lorsque l'on peut appliquer à temps le traitement constitutionnel combiné au traitement local, c'est-à-dire la cautérisation interne, la plus grande partie des malades reviennent à la santé, surtout à la campagne; 95 par 100 n'est pas trop. Pour moi, j'ai constaté ce résultat dans mon faible champ d'observations. Voilà pourquoi je soumets bien humblement cette étude clinique à l'attention de mes confrères.

Mon but est d'aider à étudier une question pratique de notre art, à l'occasion d'une maladie terrible qui décime l'humanité, et aussi pour répondre à la gracieuse invitation qu'un de vous m'a faite de collaborer à ce journal.

St. Hugues, le 15 juin 1887.

### Vésicatoire liquide.—*Bidet.*

P.—Cantharides.....	1.000 parties
Chloroforme.....	" Q. S.
Cire .....	125 "

M.—Traiter d'abord la cantharine par le chloroforme de façon à ce que le liquide distillé égale un litre, puis, ajouter la cire. Usage local au moyen d'un pinceau.—*Physician and Surgeon.*