

Pour lutter de mon mieux contre ces accidents si graves, je m'efforçai de placer le président dans une position telle que la circulation facilitée des centres nerveux pût conjurer une mort imminente. Un mouchoir chiffonné fut appliqué et maintenu légèrement sur la plaie.

Pendant ce temps le landau s'avavançait au galop des chevaux dans la direction de la préfecture où M. Carnot avait ses appartements et qui était distante de sept à huit cents mètres du lieu de l'attentat.

Arrivé à la préfecture, le président, toujours complètement inerte, et qui dans ce trajet ne donna guère d'autres signes de vie que de faibles gémissements et deux ou trois mouvements nau-séux sans vomissements, fut transporté dans sa chambre à bras-le-corps et étendu sur son lit, la tête aussi bas que possible.

Pendant qu'on apportait les instruments nécessaires, les pansements et les solutions antiseptiques réclamés dès le début à l'Hôtel-Dieu, j'appliquai sur la paroi abdominale des serviettes glacées et, comme dans le lugubre parcours, par de légères flagellations au visage, par des interpellations à voix forte, etc., j'essayai de rappeler le président à la vie. Quelques instants après, un lit de camp était dressé dans cette même chambre et, lorsque l'illustre blessé y fut transporté, je tentai la seule opération qui pût permettre, sinon de le sauver, du moins de prolonger son existence. convaincu par un nouvel examen qu'il s'agissait d'une blessure du foie et que le véritable danger immédiat était dû à une hémorrhagie interne, je n'hésitai pas, prenant la plaie comme point de départ, à pratiquer une laparotomie latérale. L'extrémité de l'index gauche introduite dans l'ouverture qu'avait faite le poignard m'avait permis de reconnaître le foie sous-jacent; un flot de sang noir s'en échappa après cette exploration rapide. A ce moment, le collapsus, loin de diminuer, paraissait s'aggraver; il ne pouvait donc être question d'anesthésie, et je me hâtai de débrider par en bas sur une longueur de 10 à 12 centimètres. Cette incision était plus ou moins oblique par rapport à la ligne blanche; elle seule pouvait donner un jour suffisant, car par en haut les côtes faisaient barrière et le poignard avait certainement pénétré de haut en bas et de dedans en dehors. Je fus frappé du peu de sang contenu en apparence dans la cavité abdominale; un léger tamponnement assécha facilement les viscères sous-jacents et en me baissant j'aperçus sous les fausses côtes le lobe gauche du foie qui saignait par sa face convexe. J'explorai cette face avec l'extrémité de l'index et bientôt je rencontrai une plaie franche, nette; de 18 à 20 millimètres de longueur, répondant bien par sa forme et sa direction à celle de la peau. Le doigt y pénétrait à une profondeur égale; on se rendait aisément compte que la plaie était en entonnoir, reproduisant ainsi la forme de la lame qui avait pénétré profondément. Pendant ces manœuvres d'exploration et