

Vivace, 12 pcs.—Rose, 1/2 pc.; solitaires; jus laiteux quand on coupe la plante; tiges très branchues, presque sans feuilles.—Graines, tiges souterraines.—Champs de grain.—Jachérer, biner.

LOBÉLIACÉES

Lobélie gonflée; Indian Tobacco.—*Lobelia inflata* L., indigène.—1 an, 1 pd.—Bleu, 1/4 pc.; grappes; cosses enflées.—Graines, dans foin et graines de graminées.—Prairies, pâturages, champs de grain vénéneuse.—Arracher, biner, sarcler.

PRIMULACÉES

Glaux maritime; Sea Milkwort.—*Glaux maritima*, L., indigène.—Vivace, 6 pcs.—Rose, 1/6 pc.—Graines, tiges souterraines.—Prairies, champs humides dans terres alcalines.—Jacherer, biner.

APOCYNACÉES

Herbe à la puce; Spreading Dogbane.—*Apocynum androsaemifolium* L., indigène.—Vivace, 1-2 pds.—Rose, 1/4 pc., en cloche, pendantes; cyme; cosses 3 pcs, par paires; tiges rouges, jus laiteux.—Graines, tiges souterraines, vent.—Champs, jachères.—Jachérer, biner.
Apocyn chanvre; Indian hemp.—*Apocynum cannabinum*, L., indigène.—Vivace, 2-3 pds.—Blanc, 1/8 pc., dressées; cymes; jus laiteux.—Graines, tiges souterraines, vent.—Champs, terrains humides.—Jachérer, biner.

ASCLÉPIADÉES

Cotonnier; Common Milkweed.—*Asclepias Cornuti*, Decaisne, indigène.—Vivace, 2-3 pds.—Rosé; 1/2 pc., ombelles.—Graines, tiges souterraines, vent.—Sol riche, toutes les cultures.—Faucher en fleur, labourer, plantes sarclées.

BORAGINÉES

Vipérine; Viper's Bugloss.—*Echium vulgare*, L., Europe.—2 ans, 6-12 pcs.—Bleu, 1/2 pc.; houtons rouges; grappes nombreuses, en longue panicule; tiges et feuilles rudes, hérissées.—Graines.—Bords des chemins, champs.—Ciseau à long manche, biner.
Face-de-Loup; Small Bugloss.—*Lycopsis arvensis*, L., Europe.—1 an