

Quand la rougeole exerce son action sur la tuberculose, comment les faits se présentent-ils ?

Voici un exemple : il s'agit d'un enfant chétif, pâle, à longs cils, à cheveux rouges ; c'est un suspect, mais il ne présente pas de signes nets de tuberculose. Il a une rougeole normale, l'éruption se fait bien, puis la température tombe ; on croit l'enfant guéri, lorsque 4 à 5 jours après le thermomètre remonte et se met à osciller ; à l'auscultation, on trouve des symptômes fluxionnaires assez nets, et des modifications de timbre dues à une adénopathie médiastine ; la tuberculose, latente jusque-là se démasque ; la température oscille pendant plus d'un mois, et maintenant, évolution rare, l'orage paraît se calmer et l'état général s'améliorer. Notons que même ces jours-ci cet enfant ne réagit ni à l'intradermo-réaction, ni à la cuti-réaction ; il est encore sous le coup de l'action empêchante de la rougeole.

Les faits ne se présentent pas toujours ainsi : la tuberculose n'éclate pas seulement chez des affaiblis ou des tuberculeux à l'état latent, souvent elle se présente chez des enfants de belle santé apparente, porteurs néanmoins d'une tuberculose que rien ne dénonce, et chez eux parfois elle évolue rapidement vers la mort.

En règle générale, lorsqu'après une rougeole normale ayant évolué sans complications, et dont la défervescence s'est bien faite, on constate une élévation de la température survenant 5 ou 6 jours plus tard, sans qu'elle soit expliquée par une otite, par une vulvite, par une broncho-pneumonie, par des troubles intestinaux, ni par une suppuration quelconque, il faut redouter la tuberculose.

Il pourra s'agir, et ce sera le cas le plus fréquent, d'une tuberculose pulmonaire ; l'auscultation orientée vers ce diagnostic permettra alors de constater de l'inégalité de la respiration, des bouffées de râles disséminés un peu partout ; parfois on notera seulement de la dyspnée, quelquefois on ne trouvera rien ou presque rien, et malgré tout il faudra suspecter quand même une localisation tuberculeuse quelconque, méningée surtout, qui ne s'affirmera que plus tardive-