

le vomissement cessa durant les premières douze heures, mais une diarrhée modérée continua, et le médicament fut continué à trois heures d'intervalle. Le troisième jour après le commencement du traitement, il n'y avait plus de vomissement et seulement deux évacuations intestinales par jour, mais d'un caractère plus naturel. Le même médicament fut continué pendant trois jours de plus, alors l'enfant parut bien et le traitement fut discontinué. Durant l'été de 1870, je traitai plus de soixante-dix cas semblables à celui qui vient d'être rapporté, comprenant des enfants de six mois à deux ans avec la même formule, et neuf sur dix recouvrèrent promptement. Les enfants qui avaient été sevrés furent nourris avec des quantités minimales et fréquemment répétées de bouillie claire faite de lait doux et de farine de froment. Dans quelques cas, le médicament parut n'exercer aucune influence sur le vomissement et la diarrhée, et d'autres remèdes eurent du succès. On se rappellera que les cas auxquels on fait ici allusion étaient récents et sans complications. Les données suivantes signaleront une autre classe de cas d'une plus grande sévérité et d'une occurrence très fréquente, durant les mois de Juillet, Août et Septembre.

2nd. Cas. 27 Juillet. Appelé pour voir l'enfant de C. D., âgé de 15 mois et non encore sevré. L'enfant avait commencé par avoir une diarrhée modérée, ou "maladie de l'été" comme on l'appelle, durant la première semaine de Juillet, laquelle avait continué, seulement avec quelques vomissements, après réplétion excessive, jusqu'au 24. Il était devenu pâle et amaigri, mais cependant la plupart du temps joyeux, et la mère, comme c'est ordinairement le cas, attribuant la diarrhée à la dentition, n'avait employé aucun remède excepté une ou deux doses d'huile de castor. Durant la nuit du 24, l'enfant devint plus agité, les évacuations intestinales ayant lieu toutes les deux ou trois heures, et rejetant promptement tout aliment quelconque. Les selles étaient très aqueuses, jaunes et nauséabondes. Le jour suivant, un médecin fut appelé qui prescrivit des doses convenables de