

Gen. **PARIA**, Lec., p. 657.

A l'espèce 4 *notata*, ajoutez les 2 suivantes :

**2. Parie très noire.** *Paria aterrima*, Oliv.—Long. .12 pce. Noire avec la tête et les pattes, jaune-roussâtre. Tête et prothorax très finement ponctués. Elytres polies, brillantes, à stries marquées par des lignes de points.

Très variable dans sa coloration, étant quelquefois totalement noire et d'autre fois plus ou moins roussâtre. Se distingue surtout de la 4 *notata*, par son prothorax et sa tête qui sont bien plus finement ponctués.

**3. Parie cou-lisse.** *Paria lævicollis*, Crotch.—Long. .12 pce. Très rapprochée des 2 précédentes, mais s'en distinguant surtout par son thorax et sa tête dont les punctuations sont à peine reconnaissables. Elytres ordinairement moins foncées avec 2 taches plus pâles, l'une à l'épaule, et l'autre un peu plus grande, vers le milieu. Pattes roussâtres.

Capturée au CapRouge.

Gen. **SYSTEMA**, Chevr., p. 679.

Aux 3 espèces mentionnées, ajoutez la suivante :

**4. Systeme de l'Hudson.** *Systema Hudsonias*, Forst.—Long. .16 pce. Noire, jambes antérieures et articles 3 à 7 des antennes, jaune. Tête et prothorax très finement ponctués. Prothorax un peu plus large que long, ses côtés droits, largement marginés. Elytres distinctement marginées, à punctuations denses. Dessous subpubescent.—R.

Capturée à St. Hyacinthe. Bien distincte des 3 autres.

## Fam. LII. COCCINELLIDES, p. 686.

Gen. **SCYMNUS**, Klug ., p. 700.

A l'espèce *caudalis*, ajoutez la suivante :

**Scymne ténébreux.** *Scymnus tenebrosus*, Muls.—Long. .09 pce. Noir avec une pubescence grisâtre, finement ponctué. La tête avec les pattes et une tache en avant aux bords latéraux du prothorax, roussâtres. Elytres sans stries, entièrement noires.

Bien distinct du *caudalis*.

## Fam. LIII. ENDOMYCHIDES, p. 700.

Gen. **MYCETINA**, Muls., p. 701.

A l'espèce mentionnée, ajoutez la suivante :

**2. Mycétine très belle.** *Mycetina perpulchra*, Newm.—Long