“ point l'ordre demandé, ainsi que l'ordre immédiatement inférieur (à droite du précédent) ;

“ 2° Faites chaque produit partiel à une demi-unité près de l'ordre marqué à droite, et écrivez immédiatement chaque produit à sa place ;

“ 3° Faites l'addition de ces produits partiels, en ne prenant de la colonne de droite que la retenue, forcée s'il y a lieu ; vous obtenez ainsi le produit total à une demi-unité près de l'ordre demandé.

“ Si ce produit s'arrête à un ordre multiple (dizaines, centaines, mille...), complétez-le à droite par des zéros.”

On commence par le chiffre de gauche du multiplicateur ; et après chaque produit partiel, on barre le chiffre qui a multiplié, et le chiffre du multiplicande sur lequel on a commencé à agir.

Pour déterminer à quel chiffre du multiplicande doit commencer le premier produit partiel, on remarque que le chiffre des unités du multiplicateur commence toujours au chiffre pointé sur la droite du multiplicande ; par suite, s'il y a un, deux, trois... chiffres à gauche des unités du multiplicateur, on conserve un, deux, trois... chiffres à droite de l'ordre pointé, et l'on supprime les autres.

A chaque produit partiel et à tout produit particulier d'un chiffre par un chiffre, on peut contrôler l'ordre du résultat, en se rappelant que l'on obtient des unités, en multipliant :

- Des unités par des unités,
- Des dizaines par des dixièmes,
- Des centaines par des centièmes,
- Des mille par des millièmes, etc.

“ Dans le produit de deux chiffres d'ordres quelconques, l'ordre du produit égale la somme des ordres des deux facteurs.” — (Voyez ci-devant, page 402.)

EXEMPLES

<p>A 1 mille près :</p> $\begin{array}{r} 32\ 647\ \overline{598} \\ 715,408\ 236 \\ \hline 22\ 853\ 3 \\ 326\ 5 \\ 163\ 2 \\ 13\ 0 \\ \hline 23\ 356\ 000 \end{array}$	<p>A 1 millième près :</p> $\begin{array}{r} 17,532\ 469\ 801 \\ 0,640\ 372\ 589 \\ \hline 10,519\ 4 \\ 701\ 3 \\ 5\ 3 \\ 1\ 2 \\ \hline 11,227 \end{array}$
---	--

On ne saurait trop s'exercer à des calculs de ce genre, pour se mettre en état de ne faire ensuite que des calculs rationnels, et de ne jamais se perdre en efforts inutiles, calculant péniblement douze et quinze chiffres pour n'en conserver ensuite que trois ou quatre, les seuls ordinairement que le bon sens permette de présenter.

Geométrie

(Réponses aux programmes officiels de 1862)

PARALLÈLES ÉQUIDISTANTES

THÉORÈME. Les parallèles qui déterminent des parties égales sur une sécante quelconque, déterminent aussi des parties égales sur toute autre sécante.

Soient BC, DE, FG, des parallèles qui déterminent sur AB des parties égales AF, FD, DB. Il

faut prouver que les parties marqués sur AC sont égales entre elles.

Menons les droites GI et EJ parallèles à AB ; les quadrilatères FI et DJ sont des parallélogrammes, et par suite GI = FD, EJ = DB.

Ainsi, dans les triangles AGF, GEI, ECJ, les côtés AF, GI, EJ sont égaux ; les angles en A, G, E, sont égaux comme correspondants, ainsi que les angles en F, I, J, qui ont les côtés respectivement parallèles.

Par suite les triangles considérés sont égaux comme ayant un côté égal adjacent à des angles respectivement égaux, et l'on en conclut l'égalité des côtés AG, GE, EC, opposés aux angles égaux F, I, J. La ligne AC est donc divisée en parties égales, ce qu'il fallait démontrer.

Donc les parallèles qui...

COROLLAIRE. “ Pour diviser une droite donnée AB en un nombre quelconque de parties égales, en 3 par exemple, ” on trace une droite indéfinie AC, sur laquelle on porte 3 parties quelconques égales entre elles ; on trace CB, puis ED et GF parallèles à CB, ce qui opère la division demandée.