

métrale, comme dans le cas présent, il n'est pas nécessaire de s'alarmer outre mesure tant que la compensation existe, c'est-à-dire tant qu'il n'y a que simple affection valvulaire avec hypertrophie compensatrice; mais une fois la compensation finie, quand les symptômes d'asthénie cardiaque se sont montrés: œdème, dyspnée, etc., le malade doit toujours être sur ses gardes, la fin pouvant être subite.

*Acné.*—N. L.—âgé de 18 ans, admis le 3 mai, présente une éruption abondante d'acné siègeant sur les épaules et la partie supérieure du dos. En même temps de nombreux comédons se remarquent aux mêmes endroits, le tout s'accompagnant de prurit assez intense. On prescrit la formule suivante de Liveing :

Soufre précipité.....	.....	$\frac{1}{2}$ once
Glycérine.....	.....	$\frac{2}{2}$ drachmes
Alcool.....	.....	1 once
Eau de rose.....	.....	3 onces
Eau de chaux.....	.....	3 onces——M.

Appliquer sur la partie malade, après un lavage minutieux, tous les soirs. A l'intérieur on prescrit le sulfure de calcium, à dose de  $\frac{1}{4}$  gr. trois fois par jour. Sous l'influence de cette médication l'acné s'améliore rapidement.

*Traitement du rhumatisme articulaire aigu.*—Plusieurs cas de rhumatisme articulaire aigu ont été traités dans le cours du mois d'avril 1887. Les deux médicaments le plus souvent employés ont été le salicylate de soude et l'antipyrine; le salicylate à dose de 10 à 15 grains, toutes les 2, 3 ou 4 heures, et l'antipyrine à dose de 15 à 20 grains, répétée au bout de deux heures, et cela matin et soir. La diminution de la douleur et l'abaissement de la température ont, la plupart du temps, été remarquables. Localement on s'est contenté de badigeonner à la teinture d'iode les articulations malades que l'on a ensuite enveloppées d'ouate. Une fois la période aiguë passée, le salicylate n'a été administré que trois fois par jour, et l'antipyrine remplacée par le carbonate de lithine (5 grains, trois fois le jour), quand les petites articulations étaient envahies, ou par le manaca.

*Traitement de la gastralgie.*—Dans un cas de douleurs gastralgiques chez une jeune fille hystérique, la formule suivante a été prescrite avec avantage :

Acide hydrocyanique dilué.....	.....	2 gouttes
Teinture de belladone.....	.....	3 "
Teinture d'aconit (B. P.).....	.....	1 goutte
Teinture de noix vomique.....	.....	5 gouttes
Eau.....	.....	2 drachmes——M.

A prendre toutes les 3, 4, 5 ou 6 heures, au besoin.