

L'UNION MÉDICALE

DU CANADA

Revue Médico-Chirurgicale paraissant tous les mois

RÉDACTEUR EN CHEF:—LE DR. E. P. LACHAPELLE.

ASSISTANT-RÉDACTEUR:—LE DR. A. LAMARCHE.

Vol. VI.

JANVIER, 1877.

No. 1.

TRAVAUX ORIGINAUX.

Quelques considérations pratiques sur les luxations
du fémur et les méthodes de réduction

PAR LE DR. A. T. BROUSSEAU, CHIRURGIEN DE L'HÔTEL-DIEU.

La devant la Société Médicale de Montréal

Les luxations du fémur sont des lésions rares; sur 114 cas de luxations diverses observées par Malgaigne à l'hôpital St. Louis, ce chirurgien n'a rencontré que six luxations de la hanche; elles sont beaucoup plus communes chez l'homme que chez la femme; elles sont très rares chez l'enfant et le vieillard. Cependant un cas a été rapporté dans le *Lancet* de 1868, qui arriva chez un enfant de 6 mois.

La tête de l'os luxé peut reposer sur tous les points du pourtour de la cavité cotyloïde; mais au point de vue pratique on a fait quatre variétés principales: 1^o en arrière, 2^o en avant, 3^o en haut, 4^o en bas