

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES TUMEURS DU SEIN CHEZ L'HOMME ¹

Dr J. E. Verreault

—

Si les tumeurs du sein se rencontrent très fréquemment chez la femme, on voit rarement la tumeur soit bénigne, soit maligne chez l'homme.

Le hasard a voulu qu'en moins de deux ans dans le service de M. le Professeur Simard, cinq malades se soient présentés à la consultation portant une tumeur de la mamelle, nous permettant ainsi d'apporter notre collaboration à leur étude.

Cependant le fait d'avoir vu autant de tumeurs malignes du sein chez l'homme, en un si court espace de temps, ne modifie en rien la notion acquise de leur très grande rareté.

Quatre de ces tumeurs étaient des cancers, l'autre un sarcôme.

OBSERVATION I.—La première observation est celle d'un vieillard de 71 ans, cardio-rénal avancé, présentant une tumeur du sein droit.

Le sein est induré, le mamelon rétracté, avec une ulcération à bords renversés, durs et qui saignent facilement; aussi nombreux ganglions durs dans l'aisselle.

Le sein est rétracté, adhérent au pectoral et même au thorax, La tumeur à la grosseur d'un œuf de poule et a débuté par le mamelon.

Le malade a raconté une histoire d'eczéma du mamelon. Il n'y eut pas d'intervention chirurgicale dans le cas présent.

OBSERVATION II.—G., âgé de 63 ans, s'est aperçu d'une grosseur, suivant son expression, dans le sein gauche, depuis deux (2) ans.

1. Travail lu au VI^e Congrès des Médecins de langue française de l'Amérique du Nord.