

semaine après notre malade reprenait sa vie normale. Les signes de la base avaient disparu, quelques frottements pleuraux seuls persistaient. Je n'ai malheureusement pas pu revoir cette malade qui aurait présenté un intérêt considérable.

Nous avons assisté à une fluxion ganglionnaire, affectant par les lymphatiques de la plèvre les groupes sus-claviculaire et juxta trachéal gauche comprimant la sous-clavière en amont du point où se jettent la jugulaire externe et l'intercostale sup. gauche.

J'ai ici, les radiographies d'un enfant de 14 ans. Son histoire ne montre rien de particulier, je vous les présente. Elles montrent une lésion tuberculeuse du poulmon gauche (en voie de guérison) et des ganglions trachéo-bronchiques assez nombreux plongeant avec les bronches dans la profondeur du poulmon dans le poulmon droit.

Voilà les quelques observations que j'avais à vous présenter sur une question presque trop vaste pour être exposée en un temps si court. Mon but a surtout été d'attirer davantage votre attention sur un sujet essentiellement pratique.

— :000 : —

L'IMPERFORATION DE L'ANUS¹

Dr CHS VÉZINA

Prof. agrégé à l'Université Laval.

Assistant-Chirurgien à l'Hôtel-Dieu.

Parmi les anomalies de développement qu'on peut rencontrer chez le nouveau-né, l'imperforation de l'anus est certainement

1. Travail lu à la Soc. Méd., nov. 1919.