

3^o Une erreur grave et souvent commise c'est qu'une hernie ancienne devenant étranglée, on pratique le taxis sans chloroforme et durant plusieurs jours de suite avant de songer à faire la kélotomie.

Qu'il me soit permis de résumer ma pensée par les conclusions suivantes que je crois pratiques et conséquemment profitables aux lecteurs de l'UNION MÉDICALE.

1^o Faire porter aux enfants et aux adolescents un bandage herniaire approprié, durant des mois, voir même des années, et la cure radicale s'en suivra dans un très grand nombre de cas.

2^o Faire porter aux adultes et aux vieillards un bon bandage contentif, non pas dans le but de les guérir, mais afin de prévenir les complications, très graves, d'irréductibilité, de contention difficile et même d'étranglement.

3^o Dès lors qu'on prévoit qu'une hernie est susceptible de telles complications, le devoir du chirurgien est de tenter la cure opératoire telle que conseillée par Trélat et autres maître en chirurgie.

4^o Si la hernie devient étranglée, essayer de la réduire par le taxis avec chloroforme, en cas d'insuccès, donner, si on le juge à propos, quelques bonnes doses de morphine et faire sur la tumeur des applications froides, d'autres conseillent plutôt des fomentations très chaudes; puis, si après douze heures (la hernie étant petite et récente), vous n'avez pas obtenu de réduction, chloroformez de nouveau le patient, et si un deuxième taxis ne réussit pas, opérez de suite, séance tenante, pendant que votre malade est encore anesthésié.

Si la hernie est grosse et ancienne, la constriction est moins forte, il y a moins de danger de gangrène, alors on peut attendre deux et même trois jours, mais pas plus, avant d'opérer; en attendant, calmez les douleurs par la morphine, faites des applications sur la tumeur herniaire; souvent le succès couronne ce traitement. Mais de grâce, n'attendez pas 4 ou 5 jours durant, et ne faites pas durant ce laps de temps une dizaine de tentatives de réduction (taxis) plus ou moins forcées.

Si ces conseils étaient suivis (je dirais à la lettre), l'on ne verrait pas tant d'enfants avec des hernies non guéries, pas tant d'adultes avec des hernies incontrôlables, et pas tant d'insuccès dans la kélotomie, parce qu'on n'attendrait pas trop tard pour avoir recours à cette opération.

Carême.—Epoque de jeûne et d'abstinence, qu'on reproche aux médecins de ne pas observer. Cela tient à ce que si nous avons l'âme catholique, notre estomac est libre-penseur. Je doute que cette façon de se gâter le tube digestif soit aussi agréable à Dieu qu'on voudrait nous le faire croire.—Dr. GRELLETY, (de Vichy).