

Hydrocèle	du testicule	{	Vaginale	{	Ordinaire
			Inguinale		
	Congénitale				
	Enkystée	{	de l'épididyme		
	de la tunique albuginée.				
Du cordon spermatique	{	Diffuse			
		Enkystée			
		Congénitale.			
Complications de l'	{	Hydrocèle vaginale compliquée d'hydrocèle enkystée du testicule.			
		Hydrocèle vaginale compliquée d'hydrocèle enkystée du cordon.			
		Hydrocèle vaginale compliquée d'hydrocèle diffuse du cordon.			
		Oschéohydrocèle	{	Hydrocèle vaginale compliquée de hernie vaginale.	
Hydrocèle enkystée du cordon compliquée de hernie inguinale.					
du sac herniaire	{	vraie			
		fausse			

Nous avons eu dernièrement deux cas d'hydrocèle congénitale de la tunique vaginale. Le premier chez un enfant âgé de six semaines, le second de deux mois. Vous savez que ce genre d'hydrocèle est constitué par la persistance du canal péritonéo-vaginal qui ordinairement s'oblitère après la descente du testicule et avant la naissance; en effet vous avez vu que chez nos petits malades nous pouvions, dans le décubitus dorsal, faire refluer le liquide dans la cavité abdominale; du reste, nous avons observé dans ces cas les mêmes symptômes que dans l'hydrocèle ordinaire, sauf la forme qui est moins bien limitée à la partie supérieure. Le testicule peut occuper diverses positions, tantôt il a terminé sa migration et se trouve au fond des bourses, *en bas, en dedans et en arrière*, tantôt, il est dans l'abdomen, tantôt enfin il est arrêté dans le canal inguinal; chez nos deux petits malades il avait atteint sa destination.

Il est de règle dans les cas de ce genre de s'abstenir de toute intervention chirurgicale. Dans notre premier cas nous avons d'abord essayé des applications de muriate d'ammoniaque en solution, mais la tumeur continuant à augmenter, nous avons cru devoir évacuer le liquide par la ponction, après quoi nous avons