

leur permettre l'usage. Enfin, l'examen de l'urine émise entre huit et dix heures du matin est surtout désigné à renseigner sur le point de savoir si l'on a vraiment réussi à diminuer ou à faire disparaître la glycosurie. (*Bull. della Soc. Lancisiana degli Osped. di Roma, XVII, 2.*)

FORMULAIRE DOSIMÉTRIQUE

MIGRAINE

Brucine.....	½ millig.
Hydro-ferro-cyanate de quini.	1 cent.
Aconitine.....	½ millig.

S.—Un granule toutes les ½ heures dans les cas aigus, puis toutes les 2 heures.

AMENORRHÉE

Arseniate de de fer.....	1 millig.
Quassine.....	2 “
Arseniate de strychnine.....	1 cent.

S.—4 à 8 granules par jour.

SYPHILIS

Proto-iodure d'hydrargyre.....	1 cent.
Arseniate de strychnine.....	½ millig.

S.—Un granule, 4 à la fois par jour.

ZONA

Arseniate de strychnine.....	½ millig.
Vératrine.....	½ “
Acide arsenieux.....	½ “

S.—Un granule toutes les heures dans les cas aigus toutes les 2 à 3 heures ensuite.

DYSENTERIE

Cotoïne.....	1 millig.
Sel de Gregory	1 “
Salicylate de Bismuth.....	1 cent.

S.—Deux granules, quatre fois par jour.

BLENNORRHAGIE

Sulphydral.....	1 cent.
Camphre mono-bromé.....	1 cent.
Cubébine.....	1 millig.
Pipérine.....	1 “

S.—Un granule toutes les heures dans les cas aigus.

DIABÈTE NERVEUX

Bromhydrate de clcutine.....	½ millig.
Hyosciamine	½ “
Camphre mono-bromé.....	1 cent.

S.—Trois à six granules dans l'intervalle des repas.

En cas de crise aiguë 1 granule toutes les ½ heures.

TOUX NERVEUSE DES HYSTERIQUES

Sulphydral.....	0,01
Sel Gregory.....	0,001
Camphre mono-bromé.....	0,01

S.—Un granule toutes les ½ heure jusqu'à effet.

VOMISSEMENTS INCOERCIBLES

Arseniate de strychnine.....	½ millig.
Hyosciamine	½ “
Chlorhydrate de morphine.....	1 “

S.—Un granule tous les quart d'heures pendant les crises jusqu'à effet.

NOTES THÉRAPEUTIQUES.

La strychnine à haute dose dans le traitement de l'intoxication par le chloroforme. — Dans un cas désespéré d'empoisonnement volontaire par le chloroforme, contre lequel tous les autres moyens avaient été vainement mis en œuvre, M. le docteur S. T. Reid, chirurgien de la marine anglaise, est parvenu à ramener le malade à la vie en lui injectant en plusieurs fois environ 0 gr. 03 centigrammes de strychnine, dose dont l'administration ne fut suivie d'aucune conséquence fâcheuse. L'action de la strychnine fut dans ce cas secondée par des manœuvres de respiration artificielle et par l'application du courant électrique.

Traitement de la blennorrhagie par l'usage simultané des injections de permanganate de potasse et d'argentine. — D'après M. le docteur Stark (de Thorn), on obtiendrait une guérison très rapide de la blennorrhagie en pratiquant chaque jour un lavage de l'urèthre