Fermes expérimentales.

CHAMPS DE POMMES DE TERRE

Les variétés suivantes de pommes de terre ont été plantées à côté les unes des autres dans un même champ. Terre sablo-argileuse légère qui a reçu au printemps 1893 environ 18 à 20 tonnes de fumier de ferme à l'acre. Récolte précédente, mais. La terre fut labourée l'automne 1894 jusqu'à environ 8 pouces de profondeur, labourée au trisoc et hersée en 1895 avant la semaille. Les pommes de terre ont toutes été plantées en rayons espacés de 2 pieds ½, les plantons ayant deux à trois yeux chacun, à intervalles de 12 à 14 pouces. La pousse de toutes les variétés a été assez uniforme et il y a eu très peu de pourriture. Elles ont toutes été plantées le 25 mai; levé 7 juin; arrachage 27 septembre.

rachage = ; sepandicte.					
<u> </u>	Acres.	F	Rendement p	ar a	cre.
Daisy	• 16	239	boisseaux	40	livres.
Northern Spy	, 10 10	236	"	56	"
Dakota Red (Rouge du Dakota)	. 14	232	"		
Variété nouvelle n° 1	. 17	225	"	18	"
Empire State	. 12	222	**	28	66
Everett		214	"	39	"
Rural Blush	· 1/4	200	"	41	66
Early Rose (Rose hâtive)	1 2	199	66	37	"
Pearce's Extra Early (Extra hâtive). $\frac{10}{12}$	196	"	9	"
McKenzie	. 13	194	"	20	"
Clarke n° 1	. 17	192	"	28	44
Early Sunrise	. 1	191	"	54	66
London	. 1	183	66	55	66
Chicago Market		179		55	"
Early Ohio	· 14	155	"	47	46

ESSAIS DE BETTERAVES.

Quatre variétés de betteraves à sucre ont été semées dans des parcelles d'un quart d'acre contiguës au champ de carottes; même sol et même façon. Elles ont toutes été semées en rayons espacés de 2 pieds $\frac{1}{2}$, 3 à 4 lb. de graines à l'acre.

Améliorée de Vilmorin.—4 acre. Semé 12 mai, levé 26 mai, arraché 21 octobre.

Rendement par acre, 9 tonnes 1,810 lb.

French White (Blanche de France).—\frac{1}{4} acre. Semé 13 mai, levé 26 mai, arraché 21 octobre. Rendement par acre, 10 tonnes 1,170 lb.

German White (Blanche d'Allemagne).—1 acre. Semé 13 mai, levé 26 mai,

arraché 21 octobre. Rendement par acre, 9 tonnes 1,406 lb.

Klein Wanzleben.—4 acre. Semé 13 mai, levé 26 mai, arraché 21 octobre. Rendement par acre, 12 tonnes 810 lb.

SOMMAIRE DES RÉCOLTES, FERME EXPÉRIMENTALE CENTRALE, PENDANT L'ANNÉE 1895.

	tonn.	lb.		boiss.	lb.			
Foin Mais ensilé. Mais coupé quand les épis étaient presque mûrs, et séché en tas pour fourrage d'hiver. Mais et fèves à cheval cultivés ensemble, ensilés. Fèves à cheval cultivées séparément, ensilées Récolte mêlée séchée comme foin. Têtes de soleils. Navets Carottes Betteraves fourragères. Betteraves à sucre.	s ensile. 274 1156 s coupé quand les épis étaient presque mûrs, et séché en tas pour fourrage d'hiver. 25 546 s et fères à cheval cultivés ensemble, ensilés. 74 1766 es à cheval cultivées séparément, ensilées. 44 1367 olte mêlée séchée comme foin. 33 38 sè de soleils. 16 79 ets. 24 80 ottes. 24 80 rets. 74 121 serayes fourracères 74 121		Blé. Seigle Avoine Orge Pois Sarrasin Ponmes de terre (patates). Fèves à cheval d'Angleterre.	667 250 67 762	14 25 59 14 10 50 35			
	823	18		ļ.	1			