

## FORMULAIRE HYPODERMIQUE

### LES MÉDICAMENTS INJECTABLES

#### ABRÉVIATIONS

<i>Assoc.</i>	Association.	<i>Pos...</i>	Posologie.
<i>F. us...</i>	Forme usitée	<i>P. T..</i>	Propriétés thérapeutiques.
<i>Ind....</i>	Indications.	<i>S....</i>	Soluble.
<i>Inj...</i>	Injection.	<i>Sol...</i>	Solution.

#### A

*Acide Nucléinique.* — (V. *Nucléinique*).

*Acide Phénique.* — V. *Phénique*.

*Acoïne* (nom déposé). — *Chlorhydr. de diparaanisylmonophénylguanidine*. — S. eau. — *P. T.* et *Ind.* : Anesthésique local doué de propriétés antiseptiques. — *Pos.* : 3 à 5 cc. de la solut. à 1 %. — *Inj.* : sous-cut.

*Aconitine*. — *F. us.* : Nitrate. — *P. T.* : Sédatif du système nerveux. Action élective sur le trijumeau, mydriatique. — *Ind.* : Douleurs névralgiques intéressant la cinquième paire de nerfs crâniens. — *Pos.* : 2 à 5/10<sup>e</sup> de milligr. par 24 h. chez l'adulte. — *Inj.* sous-cut. — *Extrêmement toxique*.

*Aadrénaline*. — *F. us.* : Chlorhydrate, borate. — Sol. facilement altérable et conservée par addition de 5% de chlorétole. — *P. T.* : Vaso-constricteur puissant, Employé surtout *localement*, par application sur les muqueuses. Pour obtenir effets généraux, on doit recourir à inj. endov. — *Ind.* : Hémoptysies légères, anesthésie loc. assoc. avec cocaïne. Quelquefois, en inj. endov. contre héminoptysie tuberc., métrorrhagies ; sans effet sur maladie d'Addison. — *Pos.* : a) *Inj. endov.* : 1 à 2 cc. sol. à 1/1.000 ;