

*Chanvre indien* :—Émétiques ou pompe gastrique. Comme antidotes chimiques : acides végétaux (citrique et acétique). Puis stimuler avec alcool. Laisser dormir le malade. Vésicatoire à la nuque.

*Acide prussique et cyanures* :—Le traitement est d'ordinaire peu efficace, et, au reste, on n'a guère le temps de l'instituer. Si on est appelé assez tôt, on peut administrer, comme antidote chimique, l'oxyde de fer fraîchement précipité avec un carbonate alcalin. Sinon, affusions froides à la face, électricité, respiration artificielle.

*Cocaïne* :—Émétique et pompe gastrique. Stimuler le système nerveux et congestionner le cerveau : alcool, opium, caféine, nitrite d'amyle, position horizontale.

*Colchique* :—Émétique, puis stimuler : alcool, café, ammoniaque, morphine (en injection hypodermique)  $\frac{1}{4}$  à  $\frac{1}{2}$  gr.

*Cantharides* :—Émétique et pompe gastrique, faire boire de l'eau de préférence aux huiles, puis rejet. Boissons émollientes. Opium, camphre, purgatifs, fomentations chaudes, bains de siège.

*Huile de croton et autres drastiques violents* :—Émétiques ; boissons émollientes, opium, bains chauds.

*Noix vomique et strychnine* :—Rejet par émétiques de préférence à la pompe gastrique : puis calmer les convulsions tétaniques par chloroforme, éther (inhalés), chloral, bromures, morphine, tabac, aconit, conium, etc.

*Chloroforme, éther, etc* :—L'empoisonnement est ordinairement consécutif aux inhalations. S'il y a asphyxie, cesser toute inhalation, air pur et frais, respiration artificielle. S'il y a syncope : cesser les inhalations ; air pur ; inversion du malade, la tête en bas, stimuler au moyen de l'éther, caféine, alcool, ammoniaque, (en injection hypodermique), digitaline, atropine (en injection hypodermique), inhalations de nitrite d'amyle, électricité.

---

Contre les vomissements de la grossesse, le docteur POPP [*Pester. med. Presse*, 1888] a obtenu de bons succès de l'emploi de l'ingluvine. Dans un cas presque désespéré il prescrivit 8 grains d'ingluvine, à prendre une demi heure avant chaque repas, et à faire suivre, immédiatement après, de deux cuillerées à soupe d'une solution [1 p. 100] d'acide muriatique. La guérison était obtenue au bout de trois semaines.