

ponnement on éviterait tout danger d'intoxication iodoformique. Les lambeaux cutanés sont ensuite rabattus sur le tampon et, au besoin, réunis par deux points de suture. L'opération doit être pratiquée rapidement, pour une narcose légère. Pour prévenir une hémorrhagie trop violente, on comprime les tissus avec de larges compresses au lieu d'avoir recours à la forcepression des nombreux vaisseaux qui donnent du sang.

LE GAIACOL CONTRE L'ARTHRITE DÉFORMANTE

Suivant le docteur G. A. Bannatyne (de Bath), le meilleur procédé de traitement du rhumatisme nouveau consisterait à administrer à l'intérieur du carbonate de gaïacol (Voir *Semaine Médicale*, 1891, Annexes, p. CCXIII) à la dose de 0 gr. 60 centigr., répétée trois fois par jour, en cachets ou en pilules, et à faire en même temps sur les jointures atteintes des applications d'un mélange à parties égales de gaïacol, on peut ajouter au mélange 5 à 10 gouttes d'essence de girofle. A la suite de cette médication, notre confrère a vu la fièvre disparaître, l'état de ses malades s'améliorer très vite, les douleurs se dissiper et la motilité des articulations lésées augmenter graduellement.

UN SONNET DE FRANCISQUE SARCEY

Un sonnet peu connu de Francisque Sarcey, qui avait subi en 1881, chez les frères de la Saint-Jean-de-Dieu, l'opération de la cataracte :

L'OPÉRATION DE LA CATARACTE

On a tiré le lit sous la haute fenêtre
D'où tombe en large nappe un beau jour, franc
[et droit.

Le patient s'y couche, il attend ; tout son être
Se roidit, frémissant d'un indicible effroi.

Perrin est calme. Il prend un acier fin et froid ;
Sous la paupière ouverte où son regard pénètre,
Il promène la pointe et cherche à reconnaître—
Pour frapper à coup sûr— le juste et bon endroit.

Il fend l'œil d'un trait sec, élargit la blessure,
Pince du cristallin la pellicule obscure
Et l'enlève : « C'est fait », dit-il, l'air simple et
[grand.

L'autre rôle épuisé. Mais soudain, ô surprise !
Il a cru voir... il voit dans une lueur grise
La main qui le torture et la serre en pleurant.

FRANCISQUE SARCEY.

FORMULAIRE DOSIMÉTRIQUE

RHUMATISME OU GOUTTE

Colechicine	1 millig.
Aconitine.....	$\frac{1}{2}$ "
Digitaline	$\frac{1}{2}$ "
Arseniate de strychnine... ..	$\frac{1}{2}$ "

S. Un granule (Chs Chantaud) toutes les $\frac{1}{2}$ heures dans les cas aiguës, jusqu'à état nauséux ou diarrhée, puis seulement un granule toutes les 2, 3 ou 4 heures.

NÉVRALGIES INTERCOSTALES

Valerianate de Quinine.....	0.02 cent.
Aconitine amorphe.....	$\frac{1}{2}$ milli.
Hyosciamine.....	1/10 "

S.—Un granule (Chs Chantaud) toutes les $\frac{1}{2}$ heures ou toutes les heures suivant la force du mal, jusqu'à effet calmant.

MAL DE MER

Sulfate de strychnine.....	$\frac{1}{2}$ millig.
Hyosciamine	$\frac{1}{4}$ "
Bromhydrate de morphine.....	1 "

S.—Un granule (Chs Chantaud) toutes les $\frac{1}{2}$ d'heures, jusqu'à disparition des vertiges et des nausées.

ENDOCARDITE

Arseniate de strychnine.....	$\frac{1}{2}$ millig.
Digitaline.....	1 "
Arseniate de fer.....	$\frac{1}{2}$ "

S.—Chez les adultes un granule (Chs Chantaud) toutes les 4, 3 ou 2 heures, suivant la violence du mal.

ANÉMIE, CHLOROSE

Arseniate de fer.....	1 millig.
Quassine	2 "
Bromhydrate de quinine.....	1 "

S.—2 à 6 granules (Chs Chantaud) par 24 heures,