l'usage domestique et pour la protection publique, l'inspection municipale du lait et des viandes offertes à la consommation.

INFLUENCE DE L'HABITATION SUR LA PRODUCTION DE LA TUBERCULOSE, *M. le Dr Guiterrez, de Mexico.*

La fréquence de la tuberculose dans les États-Unis d'Amérique, dit l'auteur, est due, en grande partie, au manque d'air pur et de lumière dans la plupart des habitations privées, ou des édifices publics. Si ceux qui, pour prévenir ou guérir cette maladie, concentrent aujourd'hui tous leurs efforts dans l'examen du lait et des viandes suspectes, faisaient, avec le même zèle, une campagne contre les habitations insalubres, ils rendraient un éminent service à l'humanité; car des milliers de personnes meurent chaque jour victimes de ce manque d'air si indispensable à la vie. C'est ce que l'on constate au Mexique où la mortalité par la tuberculose ne dépasse pas 60 par mille, lorsqu'elle est de 120 par mille aux États-Unis.

DE L'INFECTION SYPHILITIQUE COMME VÉHICULE DE LA TUBERCULOSE, *M. le Dr Carmona y Vallee, du Mexique.*

L'auteur se borne à rapporter et à commenter deux cas où il a eu occasion de constater la transmission de la tuberculose de sujet à sujet par le moyen de l'infection syphilitique. Le germe contaminant de la syphilitique a été dans les deux cas le véhicule du germe infectieux de la tuberculose.

A la suite de ces trois conférences, il y eut une discussion générale très intéressante à laquelle beaucoup de membres prirent part et dont le résultat pratique fut de recommander aux autorités sanitaires des différents pays du continent de faire de constantes observations sur les causes productrices de la tuberculose et d'insister auprès des autorités constituées pour traiter cette maladie comme une maladie infectieuse contaminante mais évitable et, par conséquent, de prendre les mesures conseillées par l'hygiène pour la surveiller, la prévenir et la contrôler. Ces mesures peuvent se résumer ainsi : déclaration des cas de la tuberculose à la période d'infection, désinfection des chambres ou du logis dans lesquels il y a eu des tuberculeux, organisation de sociétés pour la prévention de la tuberculose, établissement d'hôpitaux pour le traitement des tuberculeux, inspection des vacheries et des abattoirs, destruction