

*surmenage* passagers des parents au moment de la conception, une *fatigue* de la mère aux derniers jours de la grossesse ne sont point suffisants pour expliquer comment un seul enfant d'une famille est moins bien doué au point de vue fonctionnel nerveux que ses frères et sœurs.

6° *Incidents de la grossesse et de l'accouchement.* — La *prématuration*, nullement entachée de spécificité ou de bacillose, est souvent cause de retard dans le développement de l'enfant. Comme un fruit vert accidentellement détaché plus tôt de la branche nourricière, ainsi le prématuré se trouve privé trop tôt dans ses éléments nerveux de la chaleur, de l'hématose qui lui conviennent; et ses éléments nerveux souffrent d'insuffisance congénitale. Dans les cas les meilleurs, l'enfant met un an à compenser le retard apporté par un mois de prématuration. Il est cependant de règle, lorsque le poids de naissance a été supérieur à 4 livres, et que la prématuration n'excède pas 4 ou 5 semaines, de voir les prématurés triompher de leur retard de développement et devenir des adultes tout à fait normaux.

La *gémellité* est un gros facteur de retard dans l'évolution nerveuse. Quelle que soit la raison invoquée, il n'est que des cas rares où deux jumeaux mènent brillamment une longue existence. Souvent l'un des deux succombent, souvent ils sont atteints de troubles nerveux divers.

Tous les accoucheurs connaissent l'importance des *traumatismes* subis pendant l'accouchement, de la strangulation, et des circulaires du cordon sur l'évolution nerveuse et générale ultérieure.

Enfin faut-il incriminer encore les *infections* à point de départ digestif ou pulmonaire dans les tout premiers mois qui suivent la naissance, c'est vraisemblable. En tout cas, ces étiologies nous paraissent devoir être mises au second plan.