

Iodofome inodore.—(Dr Q. C. Smith.)

R—Pulv. iodoformi.....	ʒi
Acid. tannic.....	ʒss
Balsam. peruv.....	} a.â gtt ii
Ol. sassafras.....	
Ol. rosæ.....	
Ol. camphoræ.....	

Incontinence d'urine chez les enfants.—

R—Tinct. ergot.....	ʒii
Tinct. belladonnæ.....	ʒi
Syr. ferri iodid.....	ʒi
Syr. simpl.....	ʒi

M. Sig.—Pour un enfant de dix ans, une cuillerée à thé le matin, le midi et le soir au coucher.

Asthme.—(Dr J. G. Skaro.)

R—Extract. grindeliæ robustæ fld.....	ʒi
Extract. bellad. fld.....	ʒii
Pot. iodid.....	ʒii
Syrup. simp.....	ʒi

M.—Dose : Une demi cuillerée à thé toutes les quatre heures, augmentant si nécessité il y a. La *Grindelia robusta* est fortement recommandée dans les cas d'asthme et de bronchite.—(Therap. Gaz.—Southern Pract.)

Coqueluche.—(Dujardin-Beaumetz.)

R—Pot. bromid.....	ʒss
Sodii bromid.....	ʒi
Ammon. bromid.....	ʒss
Aquæ.....	ʒii
Syrup. chloral B. P.....	ʒss

M.—Dose : Une cuillerée à dessert ou à soupe, matin et soir.—(Journ. des connaiss. médicales.)

Potion tonique.—(Goodell.)

R—Hydrarg. bichlorid.....	gr i—ii
Liq. arsen. chlorid.....	ʒi
Acid. hydrochloric. dil.....	} a.â ʒii
Tinct. ferri chlorid.....	
Syrup. zingib.....	ʒi
Aquæ ad.....	ʒvi

M.—Dose : Deux cuillerées à thé, dans un peu d'eau, après chaque repas.—(Virg. Med. Monthly.)

Erratum.—Nous tenons à rectifier immédiatement une erreur typographique qui s'est glissée dans une des formules publiées dans la livraison de mars, erreur que nos lecteurs auront sans doute reconnue.

La seconde formule de la page 137 doit se lire ainsi :

R—Strychniæ sulph.....	gr. ss
Acid. arsenios.....	gr. ss
Aquæ.....	ʒ xvi.

Une cuillerée à soupe après chaque repas.