

M. le professeur LARAMÉE signale l'importance de bien établir le diagnostic entre le rhumatisme articulaire aigu et le rhumatisme blennorrhagique, quand il s'agit d'examens pour assurances sur la vie. Le pronostic est loin d'être le même dans les deux cas. La durée moyenne du rhumatisme blennorrhagique est de trois mois, quel que soit le traitement employé. Il ne faut pas oublier non plus que l'arthrite blennorrhagique peut quelquefois réveiller une attaque de rhumatisme articulaire aigu.

De toutes les préparations d'opium, la teinture de camphre composée ou élixir parégorique est peut-être celle qui convient le mieux aux enfants, si tant est que l'opium puisse convenir aux très jeunes sujets. En même temps que le principe narcotique, elle renferme une assez forte proportion de stimulants (alcool, camphre, acide benzoïque, huile essentielle d'anis, pour exposer moins que les autres à l'action délétère de l'opium sur les centres nerveux. Avec cela qu'elle se prête à un dosage exact. (Prof. DESROSNIERS).

La douleur est généralement marquée dans les affections du gros intestin, tandis qu'elle est absente ou fort atténuée dans les maladies de l'intestin grêle, ce qui est dû à l'absence de nerfs sensitif dans le gros intestin et à leur présence dans le petit. Les douleurs éprouvées si souvent dans la région précordiale se rattachent la plupart du temps au rhumatisme musculaire ou à une névralgie intercostale et non à une lésion cardiaque. (Prof. LARAMÉE).

Dans un cas de bronchite chronique avec expectoration difficile, M. le professeur DESROSNIERS s'est bien trouvé de la potion suivante, modification de la formule de Thomson :

Huile de lin	8 onces
Huile essentielle de gaulthérie.....	1 drachme
Huile essentielle de cannelle.....	1 drachme
Acide hydrocyanique dilué.....	100 minimes
Teinture de belladone	2 drachmes
Glycérine.....	2½ onces
Sirop simple.....	5 "
Eau.....	12 "

M.—Dose : Deux cuillerées à soupe, 3 fois par jour.

Coqueluche.—Simon.

P.—Teinture de belladone } aa
 Teinture d'aconit..... } p. acq.

Dose : De 10 à 30 gouttes dans les vingt-quatre heures.