

placenta d'épanchements sanguins, qui provoquent le réveil des contractions utérines; d'où accouchement avant terme et même avortement.

Dans l'observation que M. Puech communique, il s'agit d'une jeune primipare, arrivée au commencement du huitième mois d'une grossesse, qui jusque-là avait évolué normalement. Il y a deux ou trois jours seulement que des vomissements se sont produits après le repas, en même temps que des maux de tête. La malade avait observé que le matin au réveil elle avait le visage et les paupières bouffis; dans ces derniers temps aussi, la lecture avait dû être interrompue par suite du passage devant les yeux d'un nuage obscurcissant la vue. L'histoire du passé pathologique apprend en outre un détail important: dans le jeune âge, Mme X... a eu une scarlatine, à la suite de laquelle elle a été soignée pendant quelque temps pour une albuminurie.

L'exploration obstétricale montra que l'abdomen était occupé par un utérus gravide ayant les dimensions ordinaires d'un utérus au huitième mois de grossesse. L'enfant, bien vivant, présentait le sommet en G. A.

L'examen des urines, qui doit être pratiqué chez toute femme enceinte, s'imposait plus particulièrement encore dans le cas présent. Comme on devait s'y attendre, après les renseignements fournis par l'interrogatoire, il apprit que les urines renfermaient de l'albumine en notable quantité (7 gram. par litre).

Dès cette constatation (6 novembre), la malade fut soumise au régime lacté absolu. On prescrivit, en outre, du benzonaphtol, à la dose de 1 gr. 50. Des frictions sèches furent faites sur tout le corps, sauf sur l'abdomen. Petites promenades quotidiennes au bon du jour.

Sous l'influence de ce traitement, une réelle amélioration des phénomènes subjectifs sembla se produire: le lait, pris aux doses de trois litres et demi environ, est bien toléré, les céphalées et les troubles de la vue ont disparu.

Mais cette amélioration ne persiste pas: le 12 novembre, vers les deux heures de l'après-midi, se déclare brusquement une douleur très vive du côté gauche de l'abdomen, avec irradiations dans les lombes; la malade se plaint en outre de nausées et de maux de tête. L'exploration de l'abdomen montra que l'utérus était dur, comme tétanisé; à gauche, en un point situé près du fond de l'utérus la palpation réveille de la douleur. Il n'y a aucune modification du côté du col, qui conserve toute sa longueur. Les bruits du cœur sont toujours perçus à gauche, quoique plus obscurs que lors du premier examen. Céphalées, vomissements étaient l'indice d'une petite poussée urémique; les phénomènes notés du côté de l'utérus furent rapportés à une hémorrhagie intra-utéro-placentaire.—Repos au lit; 4 gram. de chloral.

Quoi qu'on put s'attendre à un accouchement prématuré, la nuit