

FORMULAIRE SPÉCIAL

Pommade contre l'ozène. — M. J. DENIS

Essence d'anis } aa. 20 gouttes
Créosote de hêtre }
Vaseline 30 grammes

Mélez. — Usage externe.

Introduire dans la narine gros comme un pois de cette pommade et l'inspirer fortement.

Solution pour instillations contre le coryza aigu. — VON STRIN

Acétate d'urane 0 gr. 10 centigr.
Eau distillée 10 grammes.

F. S. A. — Instiller dans chaque narine, deux ou trois fois par jour, quelques gouttes de cette solution préalablement tiédie.

Ces instillations provoqueraient un écoulement abondant de mucosités, suivi d'une diminution manifeste de tous les symptômes du coryza aigu, en outre, elle diminuerait considérablement la durée de cette affection.

L'acétate d'urane est un sel d'une belle couleur jaune citron qui s'obtient en faisant dissoudre l'oxyde d'uranium avec l'acide acétique.

Furunculose. — WIGHT

Craie préparée 12 grammes.
Eau distillée de menthe poivrée . . . 40 —
Teinture de columbo 80 —

Mélez. — A prendre : une cuillerée à café dans un verre à vin d'eau avant chaque repas. Agiter le flacon avant de s'en servir.

Comédons. — URSI

Eau oxygénée }
Vaseline pure } aa. 30 grammes
Lanoline anhydre }
Acide acétique 4 grammes.
Essence de vanille 2 S.
Mélez. — Pommade : usage externe.

Pharyngite douloureuse. — INGOLS

Sulphate de morphine 0 gr. 20 centigr.
Acide phénique } aa. 2 grammes.
Tannin }
Glycérine }
Eau distillée } aa. 15 grammes

F. S. A. — Badigeonnages.

Ozène. — DE FERRI (ROME)

Il obtient de bons résultats par les lavages avec une solution alcaline additionnée de saccharine de un à deux pour cent.

Potion antiasthmatique. — DE VON KORTIKOFFSKY

Hydrate de chloral } aa. 2 grammes.
Iodure de Potassium }
Eau 150 —
Sirop d'écorces d'oranges amères, 20 —

F. S. A. — Usage interne

A prendre : deux à cinq cuillerées à bouche par jour.

Otorrhée. — HINDON

Extrait de Saturne xx gouttes.
Acide acétique dilué VI —
Laudanum de Sydenham 20 —
Eau distillée 30 grammes.
Mélez. — Instiller dans l'oreille, trois fois par jour dix gouttes de ce mélange préalablement tiédie.

Conjonctivite granuleuse. — REYSSON

Oxyde jaune de mercure 0 gr. 20 centigr.
Oxyde de zinc }
Thymol } aa. 03 centig.
Chlorhydrate de cocaïne }
Camphre 0 gr. 03 centigr.
Vaseline 25 grammes.
Mélez. — Pommade : usage externe.

Herpès nasal. — C. LIEGESSIS

Goudron 0 gr. 3 centigr.
Acide salicylique 0 gr. 20 centigr.
Vaseline 15 grammes.
Mélez. — Pour appliquer le soir à l'orifice des narines.

La quinine dans les otites purulentes aiguës.

DE CHATELAIN (L'ANCIENNE, E. P.)

A haute dose, elle procurerait du soulagement dans le cours d'une otite purulente aiguë. L'emploi du médicament aiderait beaucoup au traitement local.

Dans le cours de l'otite moyenne aiguë et dans les cas de furunculose du pavillon, la quinine agit aussi très bien.

Asthme. (contre attaque) — C. SUGSIL

Eau 120 grammes
Iodure de potassium 2 —
Chlorate de potasse 4 —
Mélez. — A prendre : une cuillerée à bouche toutes les heures ou toutes les deux heures.

L'iode et le chlorate ne sont pas incompatibles ; c'est une erreur de croire que l'iode, s'oxydant aux dépens du chlorate, donne naissance à de l'iodate de potasse.

On recommande le chlorate aux grimpeurs de montagnes. Il facilite la respiration dans les bronchites et dans la tuberculose pulmonaire.