

plume en forme de soie ; ongles très recourbés ; queue plus courte que les ailes, légèrement fourchue. Taille très petite.

Ce genre se borne dans notre faune aux 2 espèces qui suivent :

1. Le Roitelet rubis. *Regulus calendula*, Licht. *Sylvia*, Wils. *Motacilla*, Linn.—Angl. *The Ruby-crowned Wren*.—Longueur $4\frac{1}{2}$ pouces ; ailes $2\frac{1}{3}$; queue $1\frac{1}{3}$ pouces. Parties supérieures d'un vert olive foncé, plus clair sur le croupion et sur les bords extérieurs des ailes et de la queue ; une large tache écarlate sur l'occiput, les plumes qui la forment étant blanches à la base. Dessous d'un blanc grisâtre, teint de jaune-olive, particulièrement en arrière ; un cercle autour des yeux, deux bandes sur les couvertures alaires, blanc.

Les jeunes manquent de la couronne rouge. La femelle diffère peu du mâle.

P. et R. Ce charmant petit oiseau se voit parfois au printemps et à l'automne. D'une agilité extrême il est sans cesse à explorer les branches d'arbres à la recherche des insectes. Il pose son nid dans les fourches de quelque broussaille bien feuillée et pond 5 à 6 œufs d'un blanc sale, densément tachetés et pointillés de brun et de roux.

2. Le Roitelet huppé. *Regulus satrapa*, Licht. *Sylvia regulus*, Wils. *Regulus tricolor*, Nuttall.—Angl. *The Golden-crested Wren*.—Longueur un peu moins de 4 pouces ; ailes $2\frac{1}{4}$; queue $1\frac{3}{4}$ pouces. Dessus d'un jaune olive, plus brillant sur les bords des ailes ; front avec une ligne sur l'œil et une tache en arrière, blanc ; couronne rouge circonscrite de jaune et bordée de noir, excepté par derrière ; souvent le jaune recouvre le rouge. Chez la femelle, ce cercle jaune manque à la couronne.

H. et R. Ce Roitelet se rencontre ici l'hiver, s'en allant plus au Nord en été pour y faire sa ponte. Il niche dans les broussailles et pond de 7 à 8 œufs d'un gris jaunâtre, de la grosseur d'un pois. C'est après le Colibri, le plus petit de nos oiseaux.

(A continuer).